

T I T R E D E L A T H È S E

LA FONCTION VENTRICULAIRE GAUCHE
DANS LES BRONCHOPNEUMOPATHIES
CHRONIQUES OBSTRUCTIVES
EFFETS DE L'INHALATION D'OXYGENE PUR

THÈSE

présentée à l'Université Claude Bernard - Lyon
et soutenue publiquement le 8 FEVRIER 1977
pour obtenir le grade de Docteur en Médecine

par

Nom et Prénom : MAGNIN Bruno
né le 7 Juin 1946
à Lyon (2ème)

U N I V E R S I T E C L A U D E B E R N A R D - L Y O N

U.E.R. DE MEDECINE LYON SUD-OUEST

Année 1977

N°

T I T R E D E L A T H È S E

LA FONCTION VENTRICULAIRE GAUCHE

DANS LES BRONCHOPNEUMOPATHIES

CHRONIQUES OBSTRUCTIVES

EFFETS DE L'INHALATION D'OXYGENE PUR

THÈSE

présentée à l'Université Claude Bernard - Lyon
et soutenue publiquement le 8 FEVRIER 1977
pour obtenir le grade de Docteur en Médecine

par

Nom et Prénom : *MAGNIN Bruno*

né le *7 Juin 1946*

à *Lyon (2ème)*



U.E.R. DE MEDECINE LYON SUD OUEST

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1

Président : Mr le Professeur D. GERMAIN
Premier Vice-Président : Mr le Professeur EL BAZ
Deuxième Vice Président : Mr P. PONCET, Maître-assistant
Troisième Vice Président : Mr M.H. BONNET, étudiant
Secrétaire Général de l'Université : Mr J. RAMBAUD, Administrateur Civil

Unités d'Enseignement et de Recherche (U.E.R.)

U.E.R. de Médecine GRANGE BLANCHE : Mr le Docteur B. SALLE,
Maître de Conférences
U.E.R. de Médecine ALEXIS-CARREL : Mr le Professeur R. MORNEX
U.E.R. de Médecine LYON-NORD : Mr le Docteur J.P. NEIDHART,
Maître de Conférences
U.E.R. de Médecine SUD-OUEST : Mr le Professeur J. NORMAND
U.E.R. des Sciences Pharmaceutiques: Mr le Professeur L. ODDOUX
U.E.R. des Techniques de Réadaptation : Mr A. MORGON,
Maître de Conférences
U.E.R. de Biologie Humaine : Mr le Professeur J.C. CZYBA
U.E.R. d'Education Physique et Sportive: Mr A. MILLON, Professeur d'E.P.S.
U.E.R. des Sciences Odontologiques : Mr le Docteur R. VINCENT
U.E.R. de Mathématiques : Mr le Professeur H. BUCHWALTER
U.E.R. de Physique : Mr le Professeur R. UZAN
U.E.R. de Chimie et Biochimie : Mr le Professeur J. HUET
U.E.R. des Sciences de la Nature : Mr le Professeur J. BRUN
U.E.R. des Sciences Physiologiques : Mr R. FONTANGES,
Maître de Conférences
U.E.R. de Physique Nucléaire : Mr le Professeur A SARAZIN
U.E.R. de Mécanique : Mr le Professeur J. MATHIEU
Observatoire de Lyon : Mr le Professeur J.H. BIGAY
I.U.T. 1 : Mr le Professeur B. POUYET
I.U.T. 2 : Mr J. GALLET, Directeur E.N.S.A.M.

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD

U.E.R. DE MEDECINE LYON SUD OUEST

PROFESSEURS TITULAIRES

Mrs AIMARD Gilbert	Neurologie
BRUN Jacques	Clinique Pneumo-Phtisiologique
COLOMB Daniel	Dermatologie
GIRARD Paul	Clinique Neuro-Psychiatrique et d'Hygiène mentale
GUILLEMIN Georges	Clinique Chirurgicale
LATARJET Michel	Clinique Chirurgicale
MAYER Marcel	Cancérologie
NORMAND Jean	Cardiologie
NOTTER Armand	Gynécologie Obstétrique
PINET Edouard	Radiologie
PLANCHU Marcel	Endocrinologie et Médecine Interne
ROBERT Jacques	Chaire de Génétique Médicale
TOLOT François	Médecine Interne - Médecine du Travail
VACHON Alphonse	Clinique Médicale- Maladies de l'Appareil digestif
VINCENT Daniel	Chaire de Biochimie appliquée

PROFESSEURS SANS CHAIRE

Mrs BRAILLON Georges	Anatomie
GILLY Robert	Pédiatrie
LAPRAS Claude	Neuro-Chirurgie
LOUISOT Pierre	Biochimie
MORET Robert	Biophysique
PERRIN FAYOLLE Max	Pneumo-Phtisiologie
SITE Jean	Mathématiques - Statistiques- Informatique
VIALLIER-RAYNARD Jean,	Bactériologie - Virologie

MAITRES DE CONFERENCES AGREGES

Mrs ARCHIMBAUD Jean Pierre	Urologie
BERARD Philippe	Chirurgie Générale
BERTRAND Jean Louis	Maladies Infectieuses
Mme BONNET Mireille	Ophtalmologie
Mrs BOUVIER Maurice	Rhumatologie
CABANAC Michel	Physiologie
CROISILLE Marc	Radiologie
DEVILLARD Regis	Neuro-Psychiatrie
DUBOIS Paul	Histologie
HAGUENAUER Jean Paul	O.R.L.
JEANNEROD Marc	Médecine Expérimentale
JOUVENCEAUX André	Hémobiologie
LAIR Jacques	Stomatologie
LEV RAT Roger	Médecine Interne
LOMBARD PLATET Roger	Séméiologie Chirurgicale
MICHEL Albert	Anesthésiologie
MOLLARD Pierre	Chirurgie Infantile
PALIARD Pierre	Séméiologie Médicale
REBOUILLAT Jacques	Chirurgie Générale
REVILLARD Jean Pierre	Néphrologie
ROCHET Michel	Anatomie Pathologique
ROMAGNY Gabriel	Pédiatrie
THERMET Hubert	Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire
TETE Roger	Médecine Interne
THOULON Jean-Marie	Gynécologie Obstétrique
TOUBOUL Paul	Cardiologie
TRILLET Marc	Neurologie

A MA MERE IN MEMORIAM

A MON PERE

A Mademoiselle J. GINESTE

A MA FEMME

A ELISABETH

A OLIVIER

A ANNE - CLAIRE

A MES BEAUX PARENTS

AUX MEMBRES de ma BELLE FAMILLE

CE TRAVAIL A ETE REALISE A PARTIR de DONNEES
RECUEILLIES au LABORATOIRE d' EXPLORATIONS FONCTIONNELLES
CARDIO-RESPIRATOIRES dirigé par le

Dr TARTULIER

et dans le SERVICE de CARDIOLOGIE du

Dr DEYRIEUX

à l' HOPITAL ST JOSEPH de LYON

Médecins, personnel soignant et laborantines
trouveront dans ce travail qui est aussi le leur, l'expression
de ma gratitude.

A NOTRE PRESIDENT de THESE

Monsieur le Professeur GONIN

A NOS JUGES

Monsieur le Professeur Agrégé DELAHAYE

Monsieur le Professeur Agrégé FLANDROIS

Monsieur le Professeur Agrégé KALB

A N OTRE MAITRE

Monsieur le Docteur TARTULIER

Il nous a confié ce travail et guidé notre réflexion analytique.

A MON AMI

J. BOUTARIN

AUX MEMBRES du SERVICE de CARDIOLOGIE

du LABORATOIRE d' EXPLORATIONS FONCTIONNELLES

de l' HOPITAL St JOSEPH de LYON

Mr les Dr DEYRIEUX

BLUM

BOISSON

LAVOREL

RITZ

A TOUS MES MAITRES

ET A TOUS MES AMIS de l' INTERNAT du CHR
de CHALON -- sur -- SAONE.

A Mme DUMARTY

A Mme FAIVRE

A Mme LAZZARONI

I N T R O D U C T I O N

L'intervention de modifications anatomiques ou fonctionnelles du ventricule gauche dans le tableau du coeur pulmonaire chronique fait l'objet, depuis quelques années, de discussions nombreuses.

La possibilité d'une dysfonction du ventricule gauche directement liée à l'affection pulmonaire repose sur une série de constatations anatomiques, cliniques, hémodynamiques, biochimiques plus ou moins convaincantes et plus ou moins contradictoires.

Dans l'ordre anatomique

Selon les auteurs, la fréquence de l'hypertrophie ventriculaire gauche va de 24 à 86 % des cas.

BHARGAVA a réalisé en 1973 une revue de la littérature sur ce sujet:

à côté des travaux d'EDWARDS, ALTSCHULE, MURPHY a dénombré 28 % d'hypertrophie ventriculaire gauche en se basant sur l'étude anatomique du ventricule gauche et sur des coronarographies post mortem. Dans la plupart des cas il existe une maladie artérielle athéromateuse, une hypertension artérielle systémique ou une affection vasculaire.

Dans l'ordre clinique

Les signes cliniques et radiologiques de congestion vasculaire pulmonaire (RAO 1968, SIMON 1969) sont confortés par la découverte d'une augmentation de l'eau extravasculaire pulmonaire (Mac CREDIE 1970 TURINO 1970) et par les effets bénéfiques des diurétiques sur la fonction pulmonaire (NOBLE 1966).

Dans l'ordre hémodynamique

- a - pression capillaire pulmonaire ($\bar{P}CP$)
et
pression ventriculaire gauche télédiastolique (PVGtd)

- PCP et PVGtd subissent une élévation pour RAO 1968, BAUM 1971,
LOCKHART 1972, JEZEK 1973

- tandis que WILLIAMS 1968, DAVIES 1970, KHAJA 1971, FRANK 1973
VANDERMOTEN 1976 estiment
que PVGtd a une valeur normale

- b - Etude de la fraction d'éjection du
ventricule gauche -

Les méthodes utilisées font appel à la ventriculométrie
cinéangiographique avec étude de la dilution d'un colorant ou
d'un isotope.

- La fraction d'éjection est abaissée selon
JEZEK (1973)

L'auteur a réalisé cette étude chez des malades en insuffisance
cardiaque.

- STEELE (1975) considère, par contre la fraction d'éjection
ventriculaire gauche normale.

- c - Contractilité

Il n'est guère possible d'avoir une certitude :
FRANK 1973 estime que les indices de la contractilité sont normaux.
VANDERMOTEN 1976 émet une opinion plus nuancée : la contractilité
est variable et, en tout cas, indépendante des perturbations
gazométriques.

Dans l'ordre hémodynamique

- a - pression capillaire pulmonaire ($\bar{P}CP$)
et
pression ventriculaire gauche télédiastolique (PVGtd)

- PCP et PVGtd subissent une élévation pour RAO 1968, BAUM 1971,
LOCKHART 1972, JEZEK 1973

- tandis que WILLIAMS 1968, DAVIES 1970, KHAJA 1971, FRANK 1973
VANDERMOTEN 1976 estiment
que PVGtd a une valeur normale

- b - Etude de la fraction d'éjection du
ventricule gauche -

Les méthodes utilisées font appel à la ventriculométrie
cinéangiographique avec étude de la dilution d'un colorant ou
d'un isotope.

- La fraction d'éjection est abaissée selon
JEZEK (1973)

L'auteur a réalisé cette étude chez des malades en insuffisance
cardiaque.

- STEELE (1975) considère, par contre la fraction d'éjection
ventriculaire gauche normale.

- c - Contractilité

Il n'est guère possible d'avoir une certitude :
FRANK 1973 estime que les indices de la contractilité sont normaux.
VANDERMOTEN 1976 émet une opinion plus nuancée : la contractilité
est variable et, en tout cas, indépendante des perturbations
gazométriques.

d - Intervalles de temps systoliques

- HOOPER et WHITCOMB (1974) suggèrent une réduction de ces intervalles
- UNGER 1975 remet en question la fiabilité de ce paramètre car il est possible que le volume d'éjection soit diminué.

e - test de stimulation de la valeur fonctionnelle
du ventricule gauche

Les méthodes utilisées sont les suivantes :

- surcharge volumique par Dextran : MATTHAY (1975)
- hypertension à la méthoxamine WILLIAMS (1968)
ou à l'angiotensine JEZEK (1973)

- MATTHAY et WILLIAMS obtiennent une réponse normale
- JEZEK - dont les observations ont eu lieu chez des malades en phase de décompensation cardiaque - obtient une réponse anormale. La compliance du ventricule gauche semble altérée.

En fait il convient de noter que les courbes de fonction ventriculaire gauche chez les sujets âgés sont en grande partie méconnues actuellement

Dans l'ordre Biochimique

Le métabolisme myocardique des malades atteints de Broncho pneumopathie chronique obstructive est diversement apprécié :

- soit les altérations notées ne sont pas directement imputables à la pneumopathie (MORET 1966)
- soit il est considéré comme normal (FRANK 1973)

Quels mécanismes physiopathologiques évoquer devant une éventuelle dysfonction ventriculaire gauche ?

a - L'Hypoxie

- Elle exerce un effet dépresseur sur le myocarde KATZ 1957
- KAHLER 1962 • l'hypoxie aiguë engendre une hyperkinésie
- Elle peut entraîner
une diminution de l'extraction ou de la production des lactates par le myocarde

b - L'Hypercapnie et l'acidose

leur rôle est moins bien connu :

- ODIE note une baisse de la contractilité d'un coeur isolé
- Pour SORBINI l'hypercapnie aiguë accroît la réponse neuro-adrénergique, ce qui se traduit par une augmentation des catécholamines circulantes et du débit cardiaque.
- BATEMAN 1976 - FOEX 1976
montrent que le "lavage myocardique" du CO_2 améliore les conditions métaboliques du travail d'un coeur d'animal isolé.

c - L'augmentation du débit cardiaque.

La défaillance cardiaque à haut débit résulte de la concomitance d'une hypoxie hypercapnique, d'une polycythémie et d'une hypervolémie.

d - L'existence d'anastomoses vasculaires bronchopulmonaires

- entre artère bronchique et veine pulmonaire, réalisant un shunt gauche - gauche
- entre artère bronchique et artère pulmonaire, réalisant un shunt gauche - droite.

e - L'hypertrophie et insuffisance ventriculaire droite

- Elle peut altérer la fonction ventriculaire gauche par bombement septal (KELLY 1970, STOOL 1974, BEMIS 1974)
- Pour ALTSCHULE le coeur a un fonctionnement syncytial : il existerait une continuité anatomique entre le ventricule droit et le ventricule gauche (RAO 1968)
- La dilatation ventriculaire droite pourrait dans certains cas gêner l'expansion, et par là, le remplissage ventriculaire gauche.
- L'élévation de la pression intra auriculaire droite diminue le gradient de perfusion coronaire, en particulier le réseau irriguant les cavités gauches.

f - Une dysfonction occulte du ventricule gauche

La pneumopathie la révèle ou accélère considérablement son évolution. Il peut s'agir d'une cardioangiosclérose, d'une cardiopathie ischémique ou hypertensive.

g - Des infections virales pulmonaires

Dans quelques cas des myocardites larvées seraient notées, et altèreraient la performance ventriculaire gauche.

Le problème de la dysfonction ventriculaire gauche dans les Bronchopneumopathies chroniques obstructives sévères apparaît excessivement complexe.

H. DENOLIN dans un éditorial récent (1976) fait un court rappel des différents éléments de ce problème et conclut :

"En bref, à la lumière des travaux récents, une altération anatomique ou fonctionnelle du ventricule gauche dans les broncho-pneumopathies chroniques obstructives et imputable à ces affections n'est pas démontrée et aucun mécanisme ne peut être proposé".

Les difficultés d'évaluation ressortissent

- à la grande diversité étiologique de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et des affections qui lui sont associées.
- au stade évolutif de la BPCO :
 - degré d'hypoventilation alvéolaire
 - degré d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) et d'hypertrophie ventriculaire droite (HVD)
 - l'existence d'antécédents d'insuffisance ventriculaire droite (IVD)
 - la présence d'une IVD
- à l'âge des patients : les témoins doivent être recrutés chez des sujets du même âge.
(L'involution biologique des paramètres cardiovasculaires en fonction de l'âge est encore imparfaitement connue)
- à l'incidence de l'athérosclérose patente ou latente inévitable chez des sujets tous âgés de plus de 50 ans, souvent tabagiques, éthyliques (coronaropathie, cardiopathie ischémique, hypertension artérielle systémique)
- à la méthodologie employée pour évaluer la fonction ventriculaire gauche :
 - validité et reproductibilité des mesures, mais aussi signification qu'on attribue à leurs valeurs.
 - difficulté d'appréhender la condition ventriculaire gauche à travers un paramètre unique, incapable de rendre compte de la diversité fonctionnelle de la fibre myocardique.
 - difficulté humaine à mettre en oeuvre des investigations longues et pénibles chez des malades fragiles.

Notre travail s'est heurté à tous ces écueils

Il repose sur l'étude de 18 patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), dont l'âge moyen est de 64 ans, soumis à une étude hémodynamique des cavités droites, de la circulation pulmonaire, des cavités gauches du coeur et de l'aorte, à l'état basal (N = 18), au cours de l'effort (N = 10), et pendant une inhalation d'oxygène pur (N = 18).

Le stade évolutif est variable : coeur pulmonaire confirmé avec antécédents d'IVD (10 cas), coeur pulmonaire au stade initial (6 cas), BPCO indemnes de retentissement sur la circulation pulmonaire et le coeur droit (2 cas).

L'évaluation fonctionnelle du ventricule gauche repose sur l'index cardiaque, l'index systolique, le travail systolique externe du VG, la pression ventriculaire gauche télédiastolique, la vitesse de montée de pression isovolumétrique (dp/dt) et l'index de contractilité $dp/dt/PI$ max (PI = pression isovolumétrique correspondant à dp/dt max).

Les différents paramètres ressortissant à l'hémodynamique métabolique et à l'hémodynamique pressionnelle droite et gauche, sont confrontés aux données recueillies chez 14 sujets normaux d'âge identique, ou à des valeurs théoriques tenant compte de l'âge et du débit cardiaque.

SYMBOLIQUE

UNITES - GLOSSAIRE - VALEURS NORMALES

SYMBOLE	U N I T E		VALEURS NORMALES
A	an	a g e	-
T	m	taille	-
P	kg	poids	-
S	m ²	surface corporelle	-
D C O	ml/mHg/mn	capacité de diffusion des poumons pour le CO (méthode de l'apnée)	20 à 30
D C O / C T	ml	pourcentage par rapport à la valeur théorique calculée en fonction des données biométriques	4 à 5
% N	%		-
CV	l	capacité vitale	tables de la CECA et de NANCY - retenues en FRANCE le plus souvent tenant compte de l'age, du sexe et de la taille.
VEMS	l	volume expiratoire maximal par seconde	
V max	l / mn	ventilation maximale/ minute	
V R	l	volume résiduel	
CT	l	capacité pulmonaire totale	

<u>SYMBOLE</u>	<u>U N I T E</u>		<u>VALEURS NORMALES</u>
V E M S/ CT			entre 65 et 80
V E M S/ VR			$\leq 30\%$
V	l/mn	débit ventilatoire (ventilation externe)	variable
FR	/mn	fréquence respiratoire	16 - 20
Vt	litres	volume courant ("tidal volume" anglosaxon) (ancien symbole = VC)	0,5
VA	l/mn	ventilation alvéolaire	
		$VA = \frac{VCO_2 \times 0,863}{Pa CO_2} \quad l/m^2$	2 - 3
EMP	litres	espace mort physiologique	$< 0,200$
VA/V	%	rapport $\frac{\text{ventilation alvéolaire}}{\text{ventilation totale}}$	> 60
A	air alvéolaire		
a	sang artériel		
$\bar{v}$	sang veineux mêlé		
PA O ₂	mmHg	pression partielle d'oxygène dans l'air alvéolaire	100 à 110

<u>SYMBOLE</u>	<u>U N I T E</u>		<u>VALEURS NORMALES</u>
Pa O ₂	mmHg	pression partielle d'oxygène dissout dans le sang artériel	85 à 95
PAA O ₂	mmHg	gradient alvéolo-artériel d'oxygène	< 25
Sa O ₂	pour cent	saturation oxyhémoglobinée du sang artériel	94 - 96
SV O ₂	pour cent	sang veineux mélangé (AP)	70 - 75
pH	unités		7,38 à 7,43
$\left[H^+ \right]$	nanomoles/l	concentration en ions H ⁺	37 à 42
CO ₂ tot pl	m Eq/l	CO ₂ total plasmatique	23 à 25
Pa CO ₂	mmHg	pression partielle artérielle de CO ₂ dissout	38 à 43
PAE CO ₂	mmHg	pression partielle de CO ₂ dans l'air alvéolaire expiré = fin d'expiration normale	35 - 40
PaCO ₂ - PAECO ₂	mmHg	gradient artério-alvéolaire expiré de CO ₂	< 5

<u>SYMBOLE</u>	<u>UNITE</u>		<u>VALEURS NORMALES</u>
$\text{PaCO}_2 / \text{Pa CO}_2$		rapport artério alvéolaire de CO_2 selon LA COSTE	$> 0,88$
$\text{PECO}_2 / \text{PaCO}_2$		alvéolo expiré de CO_2	$> 0,70$
FC	c p m (coups/minute)	fréquence cardiaque	60 à 80
$\dot{V} \text{ O}_2$	ml/mn STPD	consommation d'oxygène	130 - 140
$\dot{Q}$	l/mn	débit cardiaque estimé par le principe de FICK :	
		$\frac{\dot{V} \text{ O}_2 \text{ ml/mn}}{\text{Ca O}_2 - \bar{C}\bar{V} \text{ O}_2 \text{ vol p.mille}}$	2,9 à 4
IC	l/mn/m ²	index cardiaque	3
VS	ml	volume systolique = $\frac{\dot{Q}}{\text{FC}}$	70
IS	ml/m ²	index systolique = $\frac{\text{IC}}{\text{FC}}$	40 - 50
$\dot{Q} \text{ a O}_2$	ml/mn	débit d'oxygène disponible dans la circu- lation artérielle : $\dot{Q} \text{ L/mn} \times \text{CaO}_2 \text{ vol p cent}$	100 $\pm$ 30

<u>SYMBOLE</u>	<u>U N I T E</u>		<u>VALEURS NORMALES</u>
$\dot{Q} \bar{v} O_2$	ml/mn	débit d'oxygène inutilisé (dans la circulation veineuse mêlée) = $\dot{Q} \text{ l/mn} \times \bar{Cv} O_2$ vol pour cent	90 $\pm$ 20
Cap O_2	ml pour cent	capacité respiratoire du sang au pouvoir oxyphorique	18 à 20
Ca O_2	ml pour cent	contenu en oxygène du sang artériel	18 à 20
$\bar{Cv} O_2$	ml pour cent	contenu en oxygène du sang veineux mêlé	14 - 15
$\Delta a \bar{v} O_2$	ml pour cent ml de sang	différence artério veineuse en oxygène	4 - 5
$\Delta a \bar{v} O_2 \times 100$ Ca O_2 ou $\dot{V} O_2 \times 100$ $\dot{Q} a O_2$	%	taux d'extraction d'oxygène	23 - 25
P	mmHg	pression	
P	mmHg	pression moyenne	
POD	mmHg	pression auriculaire droite moyenne	< 4

<u>SYMBOLE</u>	<u>UNITÉ</u>		<u>VALEURS NORMALES</u>
PVDS	mmHg	pression ventriculaire droite systolique	20 - 30
PVDtd	mmHg	pression ventriculaire droite télédiastolique	< 4
PAPS	mmHg	pression artérielle pulmonaire systolique	20 - 30
PAPd	"	" " diastolique	5 - 10
<u>PAP</u>	"	" " moyenne (intégration électrique)	10 à 20
<u>PCP</u>	mmHg	pression capillaire pulmonaire moyenne ("sonde bloquée")	< 10
$\Delta \overline{PAP} - \overline{PCP}$	mmHg	gradient de pression artériocapillaire pulmonaire	< 10
RPT	dynes/ cm ⁻⁵ / s	résistances pulmonaires totales	400 ± 50
		$\frac{\overline{PAP} \times 80}{\dot{Q}}$ l/mn	

<u>SYMBOLE</u>	<u>U N I T E</u>		<u>VALEURS NORMALES</u>
RAP	dynes/ cm ⁻⁵ / s	résistances artériolaires pulmonaires	100 - 150
		$\Delta \overline{PAP} - \overline{PCP} \times 80$	
		$\dot{Q} \quad \text{l/mn}$	
Resist vasc system	dynes/ cm ⁻⁵ / s	résistances vasculaires systémiques	1000 à 1500
		$\overline{PAO} - \overline{POD} \times 80$	
		Ql / mn	
PAoS	mmHg	pression aortique systolique	120 - 140
PAOd	mmHg	pression aortique diastolique	70 - 80
$\overline{PAO}$	mmHg	pression aortique moyenne (intégration électrique)	90 - 100
PVGS	mmHg	pression ventriculaire gauche systolique	120 - 140
PVGtd	mmHg	pression ventriculaire gauche diastolique	< 12
dp/dt	mmHg/s	dérivée première de la pression intraventriculaire pendant la phase isovolumétrique; elle exprime la vitesse de la variation de pression intraventriculaire par rapport à l'unité de temps (s)	1200 à 2000
		le pic du dp/dt correspond à l'ouverture des sigmoïdes aortiques.	

<u>SYMBOLE</u>	<u>U N I T E</u>		<u>VALEURS NORMALES</u>
PI		pression isovolunétrique correspondant au pic dp/dt	20 à 30
$\frac{dp/dt}{PI}$	cycles s^{-1}	Indice approximatif de la contractilité ventriculaire	250 à 300
TE	m s	temps d'éjection aortique	$> 0,150$
taux Ej	l	taux d'éjection = $\frac{IS}{TE}$	65 + 10
W syst VG	gm/m2	travail systolique ventriculaire gauche (PVGS - PVGtd) x IS x 13,6	5 à 10
W syst VD	gm/m2	travail systolique ventriculaire droit (PVDS - PVDtd) x IS x 13,6	10 000 + 2 000
PVGS x FC		travail systolique interne	

SYMBOLS

$\bar{X}$

σ

t

SE

*

**

r

p 0,05

p 0,01

p 0,001

p 0,05

p 0,01

p 0,001

valeur moyenne

écart type

test de Student

estimation de la moyenne (erreur standard)

p < 0,05

p < 0,01

p < 0,001

coefficient de corrélation

pour n = 18

r = 0,468

r = 0,589

r = 0,708

pour n = 10

r = 0,632

r = 0,764

r = 0,872

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

MATERIEL D' E T U D E

Présentation des Observations

Tous les malades sont porteurs d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) d'importance variable qui sera précisée ultérieurement. Elle est attestée par des antécédents de bronchite chronique avec toux, dyspnée, cyanose, expectoration.

Dans 6 cas, les signes radiologiques suggèrent l'existence d'un emphysème pulmonaire (observations n°s 1 - 3- 5 - 6 - 7 - 13) (qui est modéré dans 3 observations : n°s 1 - 5- 7).

L'âge des malades s'échelonne de 53 à 75 ans autour d'une moyenne de 64 ans.

Il s'agit de 18 hommes.

Leurs poids varient de 41 à 85 kgs pour des tailles allant de 1m 55 à 1m 76.

* 10 ont un poids sensiblement normal (rapporté à la formule de Lorenz $P \text{ Kg} = Tcm - 100 - \left(\frac{Tcm - 150}{4} \right)$

* 2 accusent une baisse supérieure à 10%

* 2 une baisse supérieure à 30%

* 2 ont un excédent pondéral supérieur à 15%

* 2 ont un excédent supérieur à 25%

* sur les 18 cas étudiés , 10 présentent un tabagisme ancien important et 8 un éthylisme chronique

ANTÉCÉDENTS

a) respiratoires

* les antécédents respiratoires autres que la BPCO sont représentés par

- 3 tuberculoses anciennes guéries
 (observations n°s 2 - 9 - 16)
- 2 asthmes bronchiques
 (observations 3 et 10)
- 1 silicose probable
 (observation n° 14)
- 1 trachéobronchomalacie
 (observation n° 7)

b) vasculaires

- 5 hypertension artérielles systémiques (H T A) :
 - 3 hypertension artérielles systémiques discrètes
 au repos (observations n°s 6 -13 et 18)
 - 2 H T A révélées à l'effort
 (observations n°s 2 et 12)
- 1 diabète gras (observation n° 1)
- 3 coronaropathies dont 2 ayant des antécédents d'infarctus
 myocardique (observations n°s 5 -16 et 18)

Le tracé électrocardiographique (ECG) révèle des
séquelles discrètes d'infarctus myocardique dans
1 cas (observation n° 16)

En conséquence, parmi nos 18 observations, 8 ont une affection susceptible de retentir sur la fonction ventriculaire gauche.
Elles feront l'objet d'une étude séparée.

Ce sont les observations n° 1,2,5,6 ,12,13,16 et 18.

STADE EVOLUTIF

a) Groupe I : antécédents d' IVD régressive n = 10
 (observations n° 3,6,8,9,10,12,14,15,16,17)

* Chez des sujets de cet âge (53 à 75 ans) l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est admise pour des valeurs de la pression artérielle pulmonaire moyenne ($\overline{PAP}$) supérieures à 20 mmHg.

On peut considérer néanmoins que les valeurs de la $\overline{PAP}$ comprises entre 15 et 20 mmHg, sans être franchement pathologiques, appartiennent à une zone douteuse.

Suivant ce critère, les 10 malades se répartissent ainsi :

- 10 à 14 mmHg	: 1 cas
- 15 à 19 "	: 1 cas
- 20 à 29 "	: 2 cas
- 30 à 50 "	: 5 cas
- au delà de 50 mmHg	: 1 cas

La valeur moyenne de la $\overline{PAP}$ = $33,67 \pm 14,98$ mmHg

(valeurs extrêmes : 12,5 et 53 mmHg)

* La palpation épigastrique du ventricule droit est obtenue dans 8 cas sur 10

* Signes ECG d'hypertrophie - surcharge ventriculaire droite : 8 cas sur 10

* Dilatation des branches de l'artère pulmonaire 10 cas sur 10.

* Saturation oxyhémoglobinée inférieure à 85 p. cent dans
7 cas sur 10

valeur moyenne : $80,6 \pm 10$ p cent
valeurs extrêmes : 60 et 92,5 p cent
valeur normale : supérieure)
 ou)
 égale) à 94 p cent

* Hypercapnie artérielle supérieure à 50 mmHg
5 cas sur 10

valeur moyenne : $53,4 \pm 13,6$ mmHg
valeurs extrêmes : 40 et 79 mmHg
valeurs normales : 37 à 43 mmHg

b) Groupe II - absence d'antécédents d'IVD n = 8
(observations n°s 1,2,4,5,7,11,13,18)

* la valeur moyenne des $\overline{\text{PAP}}$ = $17,0 \pm 3,9$ mmHg

° Dans 6 cas (observations n°s 1,5,7,11,13, 18)
sont notés des signes cliniques ou radiologiques d'HVD et/ ou HTAP

- palpation épigastrique du ventricule droit :
2 cas sur 6
- signes ECG d'hypertrophie et/ ou surcharge ventriculaire droite : 4 cas sur 6
- dilatation des branches de l'artère pulmonaire :
5 cas sur 6
- saturation oxyhémoglobinée inférieure à 85 p cent :
2 cas sur 6

valeur moyenne : $88,1 \pm 4,7$ p cent

valeurs extrêmes: 82 et 94 p cent

- Hypercapnie au-delà de 50 mmHg : 1 cas sur 6

valeur moyenne : $44,5 \pm 5,6$ mmHg

valeurs extrêmes: 37 et 54 mmHg

° Dans 2 cas (observations n°s 2 et 4)

- le ventricule droit n'est pas perçu au creux épigastrique
- il n'y a pas de signes ECG d'hypertrophie et /ou surcharge ventriculaire droite
- dilatation des branches de l'artère pulmonaire
1 cas sur 2
- la saturation oxyhémoglobinée est toujours supérieure à 85 p cent
- la capnie est inférieure à 50 mmHg

c) Pour l'ensemble des 18 patients

- * la palpation épigastrique du ventriculaire droit est retrouvée dans
10 cas sur 18
- * les signes ECG dans 12 cas sur 18
- * la dilatation des branches de l'artère pulmonaire dans
16 cas sur 18
- * la saturation oxyhémoglobinée est inférieure à 85% dans
9 cas sur 18
- * l'hypercapnie au-delà de 50 mmHg dans
6 cas sur 18

AU TOTAL, les malades se répartissent ainsi :

- * 10 coeurs pulmonaires chroniques confirmés
- * 6 coeurs pulmonaires chroniques au stade initial
- * 2 bronchopneumopathies chroniques obstructives
simples.

DONNEES ELECTROCARDIOGRAPHIQUES

Parmi les critères évocateurs d'un retentissement ventriculaire droit, nous en retenons 4 :

- 1) Axe de Q R S au delà de $+ 110^\circ$
- 2) Axe de P au delà de $+ 80^\circ$
- 3) Existence d'ondes P " pulmonaires " hautes pointues en D2 - D3
(P_{D2} supérieure à 2,5 mm)
avec
$$P_{D2} > P_{D3} > P_{D1}$$
- 4) ondes T négatives dans les précordiales droites

- 1) 10 malades ayant des antécédents d' IVD
(observations n°s 3,6,8,9,10,12,14,15,16,17)
 - * axe de QRS au-delà de 110° dans 7 cas sur 10
(observations n°s 3,8,9,10,14,15,17)
 - * axe de P au-delà de $+ 80^\circ$ dans 8 cas sur 10
(observations n°s 3,8,10,12,14,15,16,17)
 - * ondes P pulmonaires dans 6 cas sur 10
(observations n°s 3,8,9,10,14,17)
 - * ondes T négatives dans les dérivations précordiales droites dans 7 cas sur 10
(observations n°s 3,6,8,9,10,12,14,17)

AU TOTAL

La majorité des malades de ce groupe est affectée d'anomalies électriques suggèrent un retentissement ventriculaire droit.

2) Chez 8 malades sans antécédents d' IVD

(observations n°s 1,2,4,5,7,11,13 ,18)

* l'axe de Q R S est au-delà de $+ 110^{\circ}$ dans 4 cas sur 8
(observations n°s 1,5,11,13)

* l'axe de P est au-delà de $+ 80^{\circ}$ dans 2 cas sur 8
(observations n°s 5 et 13)

* on trouve des ondes P pulmonaires dans 4 cas sur 8
(observations n°s 1,5,7,13,18)

* les ondes T sont négatives dans les précordiales droites
dans 4 cas sur 8
(observations n°s 1,7,13,18)

Le retentissement électrique ventriculaire droit est sensible dans ce groupe, une fois sur deux.

DONNEES RADIOLOGIQUES

LES critères retenus sont les suivants :

+ Aire cardiaque en cm^2 par m^2 de surface corporelle

$$S = \frac{L_{\text{cm}} \times B_{\text{cm}} \times 3,14159}{4 \times \text{surface corporelle m}^2}$$

avec

L_{cm} = distance séparant la partie supérieure de l'oreillette droite de la pointe du coeur

B_{cm} = distance séparant la partie inférieure de l'oreillette droite du point G

Les valeurs normales vont de 75 à 80 cm^2 / m^2

+ diamètre transverse du coeur rapporté au plus grand diamètre thoracique (DT/ th)

Les valeurs normales sont inférieures à 0,50

+ distance interpulmonaire (DIP) séparant le bord externe des 2 branches de l'artère pulmonaire au niveau des lobaires supérieures
rapport DIP/ T h normal $< 0,40$

Selon PARENT et coll. , il est montré que la DIP est positivement corrélée avec le degré d'HTAP.

+ Aspect radiologique des poumons

1) GROUPE I (10 malades ayant des antécédents d' IVD)

- * l'aire cardiaque par m² de surface corporelle est
accrue dans 4 cas sur 10
(observations n^os 3,8,9,14)
- * DT/Th est accru dans 4 cas sur 10
(observations n^os 6,8,12,14)
- * DIP/Th est accru dans 7 cas sur 10
(observations n^os 3,8,9,10,12,14,16)
- * Aspect radiologique des poumons
 - + 1 thoracoplastie (observation n^o 15)
 - + 1 cas suggérant un emphysème pulmonaire
(observation n^o 6 : emphysème des 2 bases)

2) GROUPE II (8 malades sans antécédents d' IVD)

- * l'aire cardiaque par m² de surface corporelle est
accrue dans 3 cas sur 8
(observations n^os 1,13,18)
- * DT/Th est accru dans 2 cas sur 8
(observations n^os 1 et 18)
- * DIP/Th est accrue dans 4 des 6 cas mesurés
(observations n^os 1,4,7,18)
- * Aspect radiologique des poumons :
 - 5 cas suggèrent un emphysème pulmonaire :
 - observation n^o 1 : emphysème discret des bases
 - " n^o 4 : emphysème important du lobe
supérieur droit
 - " n^o 5 : emphysème important lobe
supérieur et lobe
inférieur droit
 - " n^o 7 : emphysème discret du lobe
inférieur droit
 - " n^o13 : emphysème important du lobe
supérieur droit

DONNEES SPIROMETRIQUES

L'étude des données spirométriques repose sur l'ensemble
des 18 observations

CV : $\bar{X} = 2,38 \pm 0,64$ 1
valeurs extrêmes 1,30 et 3,56 1
% normale : 64 ± 19 (valeurs extrêmes 37 et 94%)

VEMS : $\bar{X} = 0,95 \pm 0,38$ 1
valeurs extrêmes 0,54 et 1,54 1
% normale : 37 ± 16 (valeurs extrêmes 18 et 68%)

Vmax : $\bar{X} = 29,22 \pm 11,36$ l/mn
valeurs extrêmes 10,77 et 48,19 l/mn
% normale : $38,9 \pm 16,7$ (valeurs extrêmes 17 et 76%)

VR : $\bar{X} = 3,13 \pm 1,06$ 1
valeurs extrêmes 1,67 et 5,58 1
% normale : $194 \pm 72,5$ (valeurs extrêmes 115 et 339%)

CT : $\bar{X} = 5,50 \pm 1,31$ 1
valeurs extrêmes 8,56 et 2,95 1
% normale : 103 ± 29 (valeurs extrêmes 65 et 166)

VEMS/CV : $\bar{X} = 39,7 \pm 10,4$
valeurs extrêmes 27,4 et 60,3
valeurs théoriques moyennes : $69,6 \pm 1,8\%$
valeurs théoriques extrêmes : 67 et 74%

VEMS/VR : $\bar{X} = 0,328 \pm 0,193$ 1
valeurs extrêmes : 0,147 et 0,804 1 } valeurs normales
entre 1 et 2

* Sur l'ensemble de ces données, il apparaît que les 18 malades
présentent un syndrome essentiellement obstructif (éventuellement
restrictif) et que la distension est constante mais variable.

CAPNIGRAPHIE1°) Ductance Artériolvéolaire

$$\frac{PA \text{ E } CO_2}{Pa \text{ } CO_2} \quad \bar{X} = 0,77 \pm 0,12$$

Valeur normale 0,88

Chez 2 malades seulement ce rapport est supérieur à 0,88
(observations n°s 1 et 12)

* La plupart des malades ont donc une augmentation de l'espace mort alvéolaire traduisant un déficit de la perfusion.

2°) Ductance Alvéolo expirée

$$\frac{P \text{ E } CO_2}{PAE \text{ } CO_2} \quad \bar{X} = 0,57 \pm 0,095$$

Dans tous les cas ce rapport reste inférieur à 0,70 et traduit l'augmentation de l'espace mort physiologique. Sauf dans l'observation n° 4 où il est égal à 0,77.

3°) Ductance globale VA/V

$$\bar{X} = 0,43 \pm 0,08$$

* Ce rapport est constamment diminué et reste dans tous les cas inférieur à 0,60.

CAPACITE DE DIFFUSION

* La capacité de diffusion mesurée dans 16 cas est abaissée chez 15 patients, particulièrement lorsqu'elle est exprimée sous la forme du rapport DCO/CT.

Les valeurs de ce rapport se répartissent de la manière suivante :

supérieures à 4	dans	1 cas	(observation n° 4)
de 3,5 à 4	"	1 cas	
de 3 à 3,5	"	3 cas	
de 2,5 à 3	"	3 cas	
de 2 à 2,5	"	4 cas	
inférieures à 2	"	4 cas	(observations n°s 7,10 13,14)

18 O B S E R V A T I O N S

L A P R E S E N T A T I O N D E S 18 D O S S I E R S
C L I N I Q U E S E S T R E A L I S E E S U R U N
M O D E V O L O N T A I R E M E N T S T E R E O T Y P E ,
D E M A N I E R E A R E N D R E C O M P T E D E S
N U A N C E S C L I N I Q U E S D ' U N M A L A D E
A L ' A U T R E , T O U T E N S O U L I G N A N T
L ' H O M O G E N E I T E D U G R O U P E

OBSERVATION n° 1 (225 936)

BOUD..... Léon 74 ans, 1 m 73, 78 kg
surface corporelle : 1 m² 93
hémodynamique : 12 mars 73

1°/ Antécédents respiratoires : rien de particulier

2°/ Antécédents cardiovasculaires : HTA et diastète de découverte récente

3°/ Evolution de la BPCO : dyspnée d'effort depuis une quinzaine d'années
avec aggravation en nette il y a 5 ans
: 2 poussées d'insuffisance respiratoire
aigüe il y a 4 ans et 2 ans
: pas d'antécédents d'I V D

4°/ Tabagisme

Ethylisme

Fractures de côtes anciennes

5°/ Tableau clinique

- malade non cyanosé mais présentant une dyspnée et un blocage thoracique d'effort
- palpation épigastrique du ventricule droit
- absence d'oedèmes
- T A : 13/75 lors de l'hémodynamique

6°/ E C G

retentissement net sur le coeur droit :

- axe de Q R S au-delà de 110°
- axe de P à 80°
- onde P D₂ = 2,5
- T négatifs dans les précordiales droites

7°/ Rx pulmonaire

- augmentation de l'aire cardiaque
- distance interpulmonaire accrue
- dilatation des branches de l'A P
- saillie de l'infundibulum

8°/ Spirométrie

<u>CV</u>	= 2,975 litres soit 85 % valeur théorique normale
<u>VEMS</u>	= 0,825 l/sec soit 35 % -
<u>VEMS/CV</u>	= 27,7 % (67)
<u>VR</u>	= 5,580 l (339 %)

9°/ Gazométrie

Pa O ₂	: 65 mmHg
Pa CO ₂	: 54 mmHg
H ⁺	: 41,7 nano E.9./l.

EN CONCLUSION

GROUPE II

(stade initial de C P C)

OBSERVATION n° 2 (241 691)

BOUR..... Eugène 67 ans, 1 m 64, 58 kg
surface corporelle : 1 m² 63
hémodynamique : 23 janvier 1974

1°/ Antécédents respiratoires

- épisode congestif pulmonaire gauche en 1951
- bacillose du sommet gauche ayant nécessité
 - a) 2 pneumothorax thérapeutiques en 1950 et 1953
 - b) une thoracoplastie gauche en 1954

2°/ Antécédents cardiovasculaires : rien de particulier3°/ Evolution de la BPCO

- discrète dyspnée d'effort depuis quelques années
- pas d'antécédents d'I V D
- 1 poussée d'insuffisance respiratoire aigüe

4°/ Tableau clinique

- malade non cyanosé sans dyspnée d'effort actuellement
- le ventricule droit n'est pas palpable au creux épigastrique
- absence d'oedèmes
- T A : 13/7

5°/ E C G : absence de signes de retentissement sur le coeur droit

- axe de QRS = + 60°
- axe de P = + 60°
- on de PD₂ = 1
- T positifs dans les précordiales droites

6°/ Rx pulmonaire

- l'aire cardiaque n'est pas augmentée
- les branches de l'artère pulmonaire ne sont pas dilatées
- l'infundibulum n'est pas visible

7°/ Spirométrie

<u>CV</u>	: 2,705 litres	(82 % N)
<u>VEMS</u>	: 1,535 l/sec.	(68 % N)
<u>VEMS/ CV</u>	: 56,6 %	(68 %) théor.
<u>VR</u>	: 1,910 l	(124 % N)

8°/ Gazométrie

Pa O ₂	: 78	mmHg
Pa CO ₂	: 38	mmHg
(H ⁺)	: 39,4	nanoEq/l

EN CONCLUSION : Groupe II

(Bronchopneumopathie chronique obstructive simple)

OBSERVATION n° 3 (231 734)

DUB..... Henri, 57 ans, 1 m 60 , 55 kg
surface corporelle = 1,57 m²
hémodynamique : 5 juin 1973

1°/ Antécédents respiratoires :

- Asthme professionnel à l'âge de 18 ans
(boulangier)

2°/ Antécédents cardiovasculaires

- Athérosclérose justiciable d'un traitement
anticoagulant
artérite des 2 jambes

3°/ Evolution de la BPCO

- Bronchite chronique remontant à une quinzaine
d'années
- première poussée d'IVD à l'âge de 53 ans
- au total 3 poussées d'IVD

4°/ Tableau clinique

- cyanose
- dyspnée et blocage thoracique d'effort
- palpation épigastrique du ventricule droit
hépatomégalie et oedème des membres inférieurs
bien jugulés par le traitement digitalo diurétique
au moment du cathétérisme
- T A : 12/7

5°/ ECG

signes de retentissement V.D.

- axe de Q R S : + 110°
- axe de P : + 80°
- onde P O₂ : 3
- T négatifs dans les précordiales droits

6°/ Rx pulmonaire

- aire cardiaque accrue
- saillie de l'infundibulum
- dilatation des branches de l'A P

7°/ Spirométrie

CV : 1,840 litre (47 % N)
 VEMS : 0,685 l/sec (24 % N)
 VEMS/CV : 37,2 % (72 %)
 VR : 3,061 litre (201 % N)

8°/ Gazométrie

PaO₂ : 56 mmHg
 PaCO₂ : 66 mmHg
 Ht : 56,9 nano Eq/l

EN CONCLUSION

GROUPE I

(coeur pulmonaire chronique confirmé)

OBSERVATION n° 4 (230 525)

DUPO..... Emile, 63 ans, 1,68 m, 83 kg
surface corporelle : 1,94 m²
hémodynamique : 15 mars 1973

1°/ Antécédents respiratoires : rien de particulier

2°/ Antécédents cardiovasculaires : rien de particulier

3°/ Evolution de la BPCO

- bronchite chronique depuis plus de 5 ans
- pas d'antécédents d'IVD
- 1 poussée d'insuffisance respiratoire aiguë

4°/ Cirrhose éthylique

- pré D-T

5°/ Tableau clinique

- le malade présente une discrète cyanose du visage (difficile à apprécier du fait des varicosités éthyliques) - Absence de toux mais petite somnolence ;

- le malade ne présente pas de dyspnée ni de blocage thoracique d'effort ;

- le ventricule droit n'est pas palpable en orthostatisme au creux épigastrique ;

- T A : 14/7

6°/ E.C.G. : aucun signe de retentissement sur le ventricule droit :

- axe de Q.R.S. : + 45°
- axe de P : + 60°
- PD₂ : 1,5
- T positifs dans les précordiales droites

7°/ Rx pulmonaire

- l'aire cardiaque n'est pas accrue
- l'infundibulum n'est pas visible
- discrète saillie des branches de l'artère pulmonaire

8°/ Spirométrie

CV	1,975 l	(44 % N)
VEMS	0,780 l/sec.	(25 % N)
VEMS/CV	39,4 %	(70 %)
VR	2,900 l	(150 % N)

9°/ Gazométrie

Pa O ₂	74 mmHg
Pa CO ₂	44 mmHg
H ⁺	38,4 nanoEq/l

EN CONCLUSION : groupe II

(Bronchopneumopathie chronique obstructive simple)

OBSERVATION n° 5 (237 459)

DUPR..... Benoit, 65 ans, 1 m 54, 50 kg
surface corporelle : 1,47 m²
hémodynamique : 23 mars 74

1°/ Antécédents respiratoires : rien de particulier

2°/ " cardiovasculaires : coronaropathie dépistée en 1955
: infarctus du myocarde en 1958

3°/ Evolution de la BPCO

- bronchite chronique "ancienne"
- 1 insuffisance respiratoire aigüe à 49 ans
- pas d'antécédents d'I V D

4°/ - cirrhose éthylique

- tabagisme (plus de 40 cigarettes/jour)

5°/ Tableau clinique

- malade non cyanosé présentant une bradypnée expiratoire, un thorax globuleux et quelques sibilances à l'auscultation.
- le ventricule droit n'est pas palpable au creux épigastrique
- TA : 11/6⁵

6°/ ECG retentissement sur la fonction ventriculaire droite :

Axe de Q R S : + 110°

Axe de P : + 90 °

P D₂ : 2,5

T plats dans les précordiales droites

7°/ Rx pulmonaire

- aire cardiaque discrètement accrue
- infundibulum non visible
- absence de dilatation des branches de l'artère pulmonaire

8°/ Spirométrie

CV	:	2,795 l (94 % N)
VEMS	:	0,815 l/sec (40 % N)
VEMS/CV	:	29,2 % (69 %)
VR	:	1,850 l (132 % N)

9°/ Gazométrie

Pa O2	:	82 mmHg
Pa CO2	:	37 mmHg
H+	:	38 nano Eq/l

EN CONCLUSION Groupe II

OBSERVATION n° 6 (231 677)

GOL..... Paul 75 ans, 1,63 m, 62 kg
surface corporelle : 1,67 m²
hémodynamique : 24 octobre 1973

1°/ Antécédents respiratoires

- gazé à l'ypérite en 1918
- épisode "congestif" en 1951
- laryngite chronique

2°/ Antécédents cardiovasculaires

HTA ancienne

3°/ Evolution de la BPCO

- Bronchite chronique depuis plus de 15 ans
- antécédents d'IVD
- 1 poussée d'insuffisance respiratoire aiguë

4°/ Ethylisme chronique

Non fumeur

5°/ Tableau clinique

- malade peu cyanosé avec une dyspnée et un blocage thoracique d'effort
- hépatomégalie majeure
- ventricule droit non palpable au creux épigastrique
- TA : 15/8

6°/ E.C.G. : coeur gauche

- axe de QRS : + 30
- axe de P : + 60
- PD₂ : 1
- T plats : dans les précordiales droites

7°/ Rx pulmonaire

- aire cardiaque accrue
- infundibulum mal visible
- dilatation des branches de l'artère pulmonaire

8°/ Spirométrie

CV	1,950 l	(61 % N)
VEMS	0,535 l/sec.	(25 % N)
VEMS/CV	27,4 %	(67 %)
VR	3,720 l	(249 % N)

9°/ Gazométrie

Pa O ₂	76 mmHg
Pa CO ₂	52 mmHg
H ⁺	43,2 nancEq/l

EN CONCLUSION : Groupe I

bien qu'une partie des manifestations pulmonaires puissent être due au ventricule gauche.

OBSERVATION n° 7 (119 189 et 217 807)

GUL..... André 69 ans, 1 m 70, 69,5 kg
surface corporelle : 1,81 m²
hémodynamique : 16 janvier 74

1°/ Antécédents respiratoires

Trachéobronchomalacie confirmée par fibroscopie

2°/ Antécédents cardiovasculaires rien de particulier3°/ Evolution de la BPCO

- Bronchite chronique depuis l'adolescence
- Absence d'antécédents d'IVD
- 1 poussée d'insuffisance respiratoire aigüe

4°/ Tabagisme ancien5°/ Tableau clinique

- malade cyanosé qui présente une importante dyspnée expiratoire avec blocage thoracique d'effort
- le ventricule droit est aisément palpé en orthostatisme au creux épigastrique
- T A : 10/6

6°/ E C G

coeur gauche

axe PRS = - 30

axe P = + 60

PD₂ = 0,5

T plats dans les précordiales droites

7°/ Rx pulmonaire

- infundibulum non visible
- dilatation des branches de l'artère pulmonaire
- aire cardiaque sensiblement normale

8°/ Spirométrie

CV : 2,953 l (85 % N)

VEMS : 0,727 l/sec (31 % N)

VEMS/CV : 24,6 % (69 %)

VR : 4,700 l (289 % N)

9°/ GazométriePa O₂ : 56 mmHgPa CO₂ : 47 mmHgH⁺ : 33,5 nano Eq/lEN CONCLUSION

GROUPE II

OBSERVATION n° 8 (75 320)

LEO.....Albert 61 ans, 1,70 m, 66 kg
surface corporelle 1,77 m²
hémodynamique le 17 décembre 1974

1°/ Antécédents respiratoires : rien de particulier

2°/ Antécédents cardiovasculaires : rien de particulier

3°/ Evolution de la BPCO

- Bronchite chronique depuis l'adolescence
- antécédents d'IVD
- 1 poussée d'insuffisance respiratoire aiguë

4°/ - Ethylisme

- Tabagisme

5°/ Tableau clinique

- thorax en tonneau bloqué en inspiration, bradypnée expiratoire
- cyanose distale
- hypersonorité thoracique
- palpation épigastrique aisée du ventricule droit
- hépato mégalie majeure avec lame d'ascite, reflux hépato-jugulaire
- TA : 12/8

6°/ E.C.G.

- | | |
|-----------|---|
| - axe QRS | : + 120 |
| - axe P | : + 90 |
| - PD2 | : 5 |
| - T | : négatif dans les précordiales droites |

7° / Rx pulmonaire

- aire cardiaque très accrue
- infundibulum pulmonaire non visible
- dilatation importante des branches de l'artère pulmonaire

8° / Spirométrie

CV	:	3,560 l	(77 % N)
VEMS	:	1,700 l/sec.	(53 % N)
VEMS/CV	:	47,7 %	(70 %)
VR	:	2 800 l	(146 %)

9° / Gazométrie

Pa O ₂	:	62 mmHg
Pa CO ₂	:	39 mmHg
H ⁺	:	36,3 nanoEq/l

EN CONCLUSION : groupe I

OBSERVATION n° 9 (230 791)

MER..... Amar 68 ans, 1 m 57, 41 kg
surface corporelle : 1,37 m²
hémodynamique : 25 janvier 73

1°/ Antécédents respiratoires

- tuberculose ancienne, "guérie"

2°/ Antécédents cardiovasculaires

rien de particulier

3°/ Evolution de la BPCO

- bronchite chronique depuis 30 ans
- antécédents d'I V D
- pas d'insuffisance respiratoire aigüe

4°/ Ethylisme

Tabagisme

Malnutrition

Ancienne intoxication benzénique

5°/ Tableau clinique

malade cyanosé très dyspnéique avec blocage thoracique
à l'effort

le ventricule droit n'est pas palpable au creux épigastrique

T A 11/6

6°/ E C G

Axe Q R S	:	+ 150
Axe P	:	+ 60
PD ₂	:	2,5
T	:	négatifs en précordiales droites

7°/ Rx pulmonaire

- Aire cardiaque accrue
- infundibulum non saillant
- dilatation des branches de l'artère pulmonaire

8°/ Spirométrie

CV	:	1,305 l (43 % N)
VEMS	:	0,545 l/sec (26 % N)
VEMS/CV	:	41,7 % (69 %)
VR	:	1,670 l (115 % N)

9°/ Gazométrie

Pa O ₂	:	39 mmHg
Pa CO ₂	:	79 mmHg
H ⁺	:	54,9 nano m/l

EN CONCLUSION

GROUPE I

OBSERVATION n° 10 (231 941)

MIC..... André, 66 ans 1,55 m 51 kg

surface corporelle : 1,48 m²

hémodynamique : 23 octobre 73

1°/ Antécédents respiratoires

- Asthme

2°/ Antécédents cardiovasculaires

rien de particulier

3°/ Evolution de la BPCO

- bronchite chronique
"très ancienne"
- antécédents d'IVD
- antécédents d'insuffisance respiratoire aigüe

4°/ Tableau clinique

- malade cyanosé et très dyspnéique
- palpation épigastrique du ventricule droit
- TA 13/7

5°/ E C G

Axe Q R S	:	+ 120
Axe P	:	+ 80
P D2	:	2,5
T	:	négatifs dans les précordiales droites

6°/ Rx pulmonaire

- Infundibulum non visible
- aire cardiaque peu accrue
- dilatation des branches de l'artère pulmonaire

7°/ Spirométrie

CV	:	2,830 l (94 % N)
VEMS	:	1,360 l/sec (66 % N)
VR	:	4,050 l (256 % N)

8°/ Gazométrie

Pa O ₂	=	65 mmHg
Pa CO ₂	=	40 mmHg
H ⁺	=	39,8 nano Eq/l

EN CONCLUSION

GROUPE I

OBSERVATION n° 11 (73 1114)

MOR..... Roger 66 ans, 1,58 m, 57 kg
surface corporelle : 1,58 m²
hémodynamique éé juin 1973

1°/ Antécédents respiratoires : rien de particulier

2°/ Antécédents cardiovasculaires : rien de particulier

3°/ Evolution de la BPCO

- bronchite chronique "très ancienne"
- pas d'antécédents d'IVD
- très nombreuses poussées d'insuffisance respiratoire aigüe

4°/ Tableau clinique

- malade peu cyanosé
- très dyspnéique
- TA 12/7

5°/ E.C.G.

- | | | |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| - AQRS | : | + 120 |
| - AxeP | : | 60 |
| - PD ₂ | : | 1 |
| - T | : | plats dans les précordiales droites |

6°/ Rx pulmonaire

- Infundibulum non visible
- aire cardiaque peu accrue
- dilatation nette des bronches de l'artère pulmonaire

7° / Spirométrie

CV	:	2,268 l	(73 % N)
VEMS	:	1,124 l sec	(53 % N)
VEMS / CV	:	49,5 %	(69 %)

8° / Gazométrie

PaO ₂	:	64	mmHg
Pa CO ₂	:	46	mmHg
H ⁺	:	41,2	nanEq/l

EN CONCLUSION : Groupe II

OBSERVATION n° 12 (193 321)

PEY..... Alexandre 71 ans, 1 m 63, 74,5 kg
surface corporelle : 1,86 m²
hémodynamique : 16 mai 73

1°/ Antécédents respiratoires déformation thoracique
rien de particulier

2°/ Antécédents cardiovasculaires "

3°/ Evolution de la BPCO

- Bronchite chronique depuis 20 ans
- antécédents d'I V D
- pas d'insuffisance respiratoire aigüe

4°/ Tableau clinique

- malade cyanosé
 - très dyspnéique
 - palpation épigastrique du ventricule droit
- TA 12/6

5°/ E C Q

Axe Q R S : 0°
Axe P : +80
PD₂ : 1
T : positifs en précordiales droites

6°/ Rx pulmonaire

- aire cardiaque peu accrue
- infundibulum pulmonaire non saillant
- dilatation des branches de l'artère pulmonaire

7°/ Spirométrie

CV	: 2,500 l (74 % N)
VEMS	: 1,509 l/sec (67 % N)
$\frac{VEMS}{CV}$	: 60,3 % (67 %)

8°/ Gazométrie

Pa O ₂	: 73 mmHg
Pa CO ₂	: 40 mmHg
H ⁺	: 39,8 nano Eq/l

EN CONCLUSION

GROUPE I

OBSERVATION n° 13 (230 269)

PRA..... Jean 63 ans, 1 m 63 53,5 kg
 surface corporelle : 1,57 m²
 hémodynamique : 31 octobre 73

1°/ Antécédents respiratoires

- infiltrat non bacillaire du sommet
gauche en 1959

2°/ Antécédents cardiovasculaires

- rien de particulier

3°/ Evolution de la BPCO

- bronchite chronique "ancienne"
- absence d'antécédents d'I V D
- " d'insuffisance respiratoire aigüe
- dyspnée d'effort depuis 3 ans

- 4°/ - ancien polisseur sur métaux
 - tabagisme

5°/ Tableau clinique

malade cyanosé présentant une dyspnée d'effort
 le ventricule droit est palpable au creux épigastrique
 T A : 14/75

6°/ E C Q

Axe Q R S : + 110
 Axe P : + 100
 P D₂ : 2,5

T négatifs en précordiales droites

7°/ Rx pulmonaire

- Aire cardiaque accrue
- saillie de l'infundibulum
- dilatation des branches de l'artère pulmonaire

8°/ Spirométrie

CV	:	2,568 l (63 % N)
VEMS	:	0,706 l/sec (25 % N)
VEMS/CV	:	27,5 % (70 %)
VR	:	2,610 l (154 % N)

9°/ Gazométrie

Pa O ₂	:	58 mmHg
Pa CO ₂	:	44 mmHg
H ⁺	:	39,8 nano Eq/l

EN CONCLUSION

GROUPE II

OBSERVATION n° 14 (75 1432)

RES..... Amar, 53 ans, 1 m 63, 45 kg
surface corporelle : 1,42 m²
hémodynamique : 24 juillet 75

1°/ Antécédents respiratoires

- silicose chez un ancien tailleur de pierre

2°/ Antécédents cardiovasculaires

rien de particulier

3°/ Evolution de la BPCO

- la dyspnée d'effort est apparue il y a plus de 5 ans
- le malade a présenté plusieurs poussées d'I V D
- une poussée d'insuffisance respiratoire aigüe

4°/ Tableau clinique

- malade cyanosé et dyspnéique
- ventricule droit palpable au creux épigastrique
- hépatomégalie et discret reflux hépatojugulaire
- insuffisance tricuspidiennne

T A 9⁵/5

5°/ E C G

Axe Q R S : + 120
Axe P : + 90
PD2 : 3
T : négatifs en précordiales droites

6°/ Rx pulmonaire

- Aire cardiaque très accrue
- saillie de l'infundibulum
- dilatation des branches de l'artère pulmonaire

7°/ Spirométrie

CV	: 1,570 l (37 % N)
VEMS	: 0,559 l/sec (18 % N)
VEMS/CV	: 35,6 % (74 %)
VR	: 3,930 l (260 % N)

8°/ Gazométrie

Pa O ₂	: 44 mmHg
Pa CO ₂	: 69 mmHg
H ⁺	: 39,8 nano Eq/l

EN CONCLUSION

GROUPE I

OBSERVATION N° 15 (141 826)

ROC..... Francis 62 ans, 1,65 m, 85 kg,
surface corporelle : 1,93 m²
hémodynamique : 2 octobre 1975

1° / Antécédents respiratoires

- bacillose il y a 30 ans, "guerie"

2° / Antécédents cardiovasculaires : rien de particulier3° / Evolution de la BPCO

- bronchite chronique depuis plus de 10 années
- antécédents d'IVD
- antécédents d'insuffisance respiratoire aiguë
- apparition de la dyspnée d'effort à l'âge de 49 ans.

4° / Tableau clinique

- malade cyanosé, dyspnéique
- le ventricule droit n'a pu être palpé au creux épigastrique
(vue l'obésité)
- hépatomégalie, reflux hépatojugulaire
- TA 11⁵/5

5° / E.C.G.

- axe QRS : + 110
- axe P : + 100
- P_{D2} : 1,5
- T : positifs en précordiales droites

6°/ Rx pulmonaire

- aire cardiaque peu accrue
- infundibulum non saillant
- dilatation des branches de l'artère pulmonaire

7°/ spirométrie

CV	:	1,947 l	(46 % N)
VEMS	:	0,685 l/sec.	(24 % N)
VEMS/CV	:	35,1 %	(70 %)
VR	:	3,330 l	(189 % N)

8°/ Gazométrie

Pa O ₂	:	62	mmHl
Pa CO ₂	:	51	mmHg
H ⁺	:	46,2	nano Eq/l

EN CONCLUSION : Groupe I

OBSERVATION n° 16 (75 1078)

SOR..... François 63 ans 1 m 76 71 kg
surface corporelle : 1,87 m²
hémodynamique : 15 juillet 1974

1°/ Antécédents respiratoires

- thoracoplastie (tuberculose du sommet droit)

2°/ Antécédents cardiovasculaires

- infarctus du myocarde en 1973

3°/ Evolution de la BPCO

- la bronchite chronique remonte à 13 ans
- le malade a des antécédents d'I V D
- antécédents d'insuffisance respiratoire aigüe :
épisode asphyxique à début brutal avec choc.

4°/ Tableau clinique

- déformation thoracique importante (cypho-scoliose)
- malade cyanosé, très dyspnéique
- les jugulaires sont tendues avec reflux hépatojugulaire
hépatomégalie
- T A : 10/7

5°/ E C G

Axe QRS : + 30
Axe P : + 80
P D₂ : -
T : positifs en précordiales droites

6°/ Rx pulmonaire

- aire cardiaque non accrue
- saillie de l'infundibulum
- dilatation des branches de l'artère pulmonaire

7°/ Spirométrie

CV	: 2,105 l (41 % N)
VEMS	: 0,990 l/sec (28 % N)
VEMS/CV	: 46,9 % (20 %)
VR	: 2,700 l (127 % N)

8°/ Gazométrie

Pa O ₂	: 59 mmHg
Pa CO ₂	: 49 mmHg
H ⁺	: 38,9 nano Eq/l

EN CONCLUSION

GROUPE I

OBSERVATION n° 17 (231 177)

VER..... Roger 55 ans, 1,70 m, 59 kg
 surface corporelle : 1,69 m²
 hémodynamique : le 18 mai 1973

1°/ Antécédents respiratoires : rien de particulier

2°/ Antécédents cardiovasculaires : rien de particulier

3°/ Evolution de la BPCO

- bronchite chronique remontant à plus de 15 ans
- antécédents d'IVD
- pas d'antécédents d'insuffisance respiratoire aiguë

4°/ - tabagisme
 - éthylisme

5°/ Tableau clinique

- malade cyanosé avec dyspnée d'effort et de primo décubitus
- conjonctives hypervascularisées
- palpation épigastrique du ventricule droit
- hépato mégalie

6°/ E.C.G.

- axe QRS : + 110
- axe P : + 80
- P_{D2} : 2,5
- T : négatifs en V₁
 positifs en V₂ - V₃

7°/ Rx pulmonaire

- aire cardiaque modérément accrue
- infundibulum faisant saillie
- dilatation des branches de l'artère pulmonaire

8°/ Spirométrie

CV	:	3,370 l	(72 % N)
VEMS	:	1,425 l/sec.	(43 % N)
VEMS/CV	:	42 %	(72 %)
VR	:	2,430 l	(134 % N)

9°/ Gazométrie

Pa O ₂	:	56 mmHl
Pa CO ₂	:	49 mmHg
H ⁺	:	43,1 nano Eq/l

EN CONCLUSION : Groupe II

OBSERVATION n° 18 (99 659)

VUE..... Georges 65 ans 1 m 63 70 kg
surface corporelle : 1 m 75
hémodynamique : 3 janvier 1974

1°/ Antécédents pulmonaires : rien de particulier

2°/ " cardiovasculaires :
- H T A ancienne
- coronaropathie connue depuis 1964

3°/ Evolution de la BPCO
- Bronchite chronique depuis 25 ans
- pas d'antécédents d'I V D
- pas d'antécédents d'insuffisance respiratoire aigüe

4°/ Tableau clinique
- malade cyanosé, dyspnéique
- blockpnée de decubitus
- pas de palpation épigastrique du ventricule droit

5°/ E C G
Axe QRS : + 60
Axe P : + 90
PD₂ : 2,5
T : négatif en V
positif en V₂ V₃

6°/ Rx pulmonaire

- Aire cardiaque accrue
- infundibulum mal visible
- dilatation importante des branches de l'artère pulmonaire

7°/ Spirométrie

CV	: 1,635 l (40 % N)
VEMS	: 0,620 l/sec (22 % N)
VEMS/CV	: 38,1 % (70 %)
VR	: 2,860 l (169 % N)

8°/ Gazométrie

Pa O ₂	: 77 mmHg
Pa CO ₂	: 46 mmHg
H ⁺	: 41,2 nano Eq/l

EN CONCLUSION

GROUPE II

METHODES D'INVESTIGATION

I - ETAT BASAL

a - spirographie

Les données spirométriques sont généralement recueillies 1 ou 2 jours avant le cathétérisme cardiaque.

Un spirographe de Cara en circuit fermé détermine :

- la capacité vitale en litres (CV)
- le volume expiratoire maximal par seconde en litres
ou épreuve de TIFFENEAU (VEMS)
- la ventilation maximale par minute en litres/mn (V Max)

b - détermination du volume résiduel

Appareils utilisés :

- Spirographe ventilé de Cara
- Analyseur d' Hélium CIPRO à thermoconductivité

Volumes déterminés :

- Capacité résiduelle fonctionnelle en litres (CRF)
- Volume expiratoire de réserve en litres (VER)
- Volume résiduel en litres
($VR = CRF - VER$)
- Capacité pulmonaire totale en litres
($CT = VR + CV$)

c - Capacité de diffusion alvéolo capillaire

- méthode : apnée inspiratoire pendant 10 secondes
(OGILVIE et FOSTER)
- Appareils : analyseur d' Helium CIPRO
analyseur de CO (ANARAK SCHLUMBERGER)
- Valeurs déterminées :
 - + DLCO ml/mmHg/ mn
 - + DLCO/ CT
 - = diffusion par litre de capacité
pulmonaire totale

d - DONNEES VENTILATOIRES et
METABOLIQUES GENERALES

Méthode en circuit ouvert

L'air expiré est recueilli dans un sac de Douglas tandis que la fréquence respiratoire est enregistrée automatiquement.

L'analyse de l'air expiré est réalisée par analyseurs rapides de CO₂ et d' O₂ (JAEGER)

La détermination volumétrique est faite grâce à un compteur à gaz.

La température ambiante est de 22 à 25 °.

Mesures effectuées :

- consommation d'oxygène en ml par minute STPD (V O₂)
- rejet de gaz carbonique en ml par minute STPD (VCO₂)
- quotient respiratoire (R) = $\frac{V \text{ CO}_2}{V \text{ O}_2}$
- ventilation pulmonaire (U) litris
- volume courant (Vt) litres
- fréquence respiratoire (FR) par minute
- ventilation alvéolaire (VA) litres/ minute
- $$= \frac{V \text{ CO}_2 \times 863}{Pa \text{ CO}_2} \quad (\text{pression partielle artérielle de CO}_2)$$
- rapport VA/V normalement entre 60 et 80%

e) Dosage des gaz du sang

Appareils : oxymètre de BRINKMAN (KIPP)
 : appareil manométrique de VAN SLYKE
 : pHmètre RADIOMETER
 avec électrode thermostatée à 38°
 : électrodes de CLARKE et SEVERINGHAUS
 (I L meter)

Valeurs déterminées

- : Saturation oxyhémoglobinée du sang artériel (SaO_2 pour cent)
- : Saturation oxyhémoglobinée du sang veineux mêlé ($\text{S}\bar{\text{v}}\text{O}_2$ pour cent)
- : CO_2 total plasmatique artériel (CO_2 tot pl) en vol pour cent
- : pH à 38°
- : Pression partielle de CO_2 dissout dans le plasma en mmHg (Pa CO_2) méthode directe (électrode de Severinghans)
 ou méthode indirecte (équation d'Henderson HASSELBACH)
- : Capacité oxyphorique du sang (ml pour cent) déterminée par l'appareil de VAN SLYKE après tonométrie à l'air ambiant humidifié (Cap O_2 pour cent)
- : contenu en oxygène du sang artériel

$$\text{CaO}_2 = (\text{CapO}_2 - 0,45) \times \text{Sa O}_2 + \text{PaO}_2 \times 0,003$$
 (Ca O_2 vol pour cent)
- : contenu en oxygène du sang veineux mêlé

$$\text{C}\bar{\text{v}}\text{O}_2 = (\text{CapO}_2 - 0,45) \times \text{S}\bar{\text{v}}\text{O}_2 + \text{PvO}_2 \times 0,003$$
 ($\text{C}\bar{\text{v}}\text{O}_2$ vol pour cent)

valeurs déterminées

- : différence artério veineuse en oxygène
($\Delta a \bar{v} O_2$ vol pour cent)
- : taux d'extraction
($\frac{\Delta a \bar{v} O_2}{Ca O_2} \times 100$ pour cent)
- : Pression partielle de l'oxygène artériel
(électrode de CLARKE)
(Pa O₂ mmHg)

f) mesure des gaz alvéolaires

valeurs déterminées

- : Pression de l'oxygène alveolaire
 $PAO_2 = PI O_2 - \frac{Pa CO_2}{R}$
 $PI O_2 =$ pression de l'oxygène inspiré
 $= FIO_2 \times B - 47$
 $B =$ pression barométrique
- : Pression du CO₂ alvéolaire obtenue par
capnigraphie en fin d'expiration normale
 $PA CO_2$

g) HEMODYNAMIQUE

Les pressions sont recueillies au moyen de têtes manométriques TELCO.

Les pressions moyennes sont obtenues par intégration électrique.

- Situation générale - l'investigation se déroule dans la matinée.

Le malade est à jeun et ne reçoit pas de prémédication.

La température de la salle oscille entre 22 et 25°

Le sujet est allongé sur une table de radiologie pendant toute

la durée des investigations (Etat basal - inhalation d'oxygène, épreuve d'effort)

- Voie d'abord 1) dénudation de la veine basilique au pli du coude ou humérale au tiers inférieur du bras ;
une sonde de calibre 6 F ou 7 F (type Cournand) est bloquée en position capillaire pulmonaire puis retirée dans l'artère pulmonaire lors de la mesure du débit cardiaque.
- 2) les cavités gauches sont atteintes (après artériotomie de l'humérale) par une microsonde de calibre 8 F du type Allard Laurens successivement poussée dans l'aorte puis le VG.

- PRESSIONS

Les pressions mesurées sont les suivantes :

* pressions droites (mmHg)

- pression artérielle pulmonaire bloquée
("capillaire pulmonaire ") ($\bar{P}_{CP}$)
- pression artérielle pulmonaire
 - systolique (PAPS)
 - diastolique (PAPd)
 - moyenne ($\bar{P}_{AP}$)
- pression ventriculaire droite
 - systolique (PVDS)
 - diastolique (PVDtd)
- pression auriculaire droite moyenne ($\bar{P}_{OD}$)

* pressions gauches

- pressions ventriculaires gauches
 - systolique : PVGS
 - télédiastolique (repérée sur le pic de londe R ou le départ de dp/dt) PVGtd
- pressions aortiques
 - systolique : PAoS
 - diastolique : PAod
 - moyenne : $\bar{P}_{Ao}$

- Contractilité

- Indices de contractilité du VG

Appareil utilisé Module SIEMENS connecté à la pression
recueillie par le microcapteur ALLARD LAURENS

* (dp/dt)

valeur mesurée dérivée première de la pression isovolumétri -
que du ventricule gauche dp/dt

signification le pic de dp/dt exprime la vitesse de montée de
la pression isovolumétrique.

Il s'exprime en mmHg /s

* $\frac{dp/dt}{PI}$ Rapport entre le pic de dp/dt et la pression isovo -
lométrique correspondante.

Il s'exprime en cycles sec^{-1} .

II - EPREUVE D'EFFORT

Une épreuve ergométrique est réalisée chez 10 patients.
Le malade reste en clinostatisme sur la table de radiologie et
pédale sur un ergomètre ELEMA SCHONANDER.

L'effort dure 5 à 10 minutes; les aparamètres sont recueillis entre
la 7ème et la 10ème minutes pour que le malade atteigne un régime
stable.

L'intensité de la charge imposée est fonction des caractéristiques
biométriques (sexe - age - capacité vitale - ventilation maximale
par minute) et de la condition cardiaque.

Les 10 patients effectuent des efforts modestes : 10 à 40 watts.
La condition cardio respiratoire des 8 malades restant ne permet
pas la réalisation d'un effort.

Les mesures ventilatoires, gazométriques et hémodynamiques re -
cueillies à l'état basal sont répétées au cours de l'effort.

III - INHALATION D'OXYGENE PUR

L'oxygène pur comprimé est détendu dans un sac de DOUGLAS. Le malade inhale l'oxygène en circuit ouvert, grâce à un embout buccal muni de valves inspiratoires et expiratoires.

L'analyse en continu des gaz expirés permet de contrôler le moment où la dénitrogérration alvéolaire est achevée : 15 à 25 mn sont nécessaires chez les patients atteints d'obstruction bronchique et de distension pour que le lavage alvéolaire soit total.

La PO_2 alvéolaire (PAO_2) est obtenue par la formule :

$$PAO_2 = (B - 49) - PaCO_2$$

- où . B est la pression barométrique
 . 49 la pression de la vapeur d'eau à 38°
 . Pa CO₂ la pression partielle du CO₂ artériel estimée identique à la pression du CO₂ alvéolaire.
- la mesure du débit cardiaque par le principe de FICK est entachée de causes d'erreurs lorsque l'atmosphère inhalée diffère de l'air ambiant.

La détermination de la consommation d'oxygène est pratiquement impossible en circuit ouvert car la précision des analyseurs pour de fortes concentrations d'oxygène est très aléatoire.

Aussi, chez nos patients, la $\dot{V}O_2$ a-t-elle été estimée identique à celle observée en air ambiant (BENEDICT et HIGGINS 1911 BARRAT -BOYES et WOOD 1958).

- Les concentrations en O_2 du sang artériel ou du sang veineux mêlé sont déterminées directement par analyse à l'appareil de VAN SLIKE.
- La PO_2 artérielle est mesurée par une électrode de CLARKE (IL METER) après calibrage en O_2 par humidifié
- Normalement, l'inhalation d' O_2 pur entraîne une élévation considérable de
 - la PAO_2 (650 à 700 mmHg)
 - et
 - de la PaO_2 (550 à 600 mmHg)

IV - VALEURS NORMALES DE REFERENCE

- Les données spirométriques théoriques tiennent compte du sexe, de l'âge et de la taille.

Elles sont fournies par la CECA et l' Ecole de NANCY.

- Les données hémodynamiques métaboliques recueillies à l'état basal

(débit cardiaque, transport, consommation et extraction de l'oxygène) sont comparées à celles de 14 sujets normaux dont l'âge est superposable à celui des sujets étudiés (53 à 75 ans)

- Les données hémodynamiques pressionnelles de la circulation pulmonaire, du coeur gauche et de l'aorte , sont comparées à des valeurs théoriques tenant compte de l'Age (A) et du débit cardiaque ^(Q) au repos et au cours de l'effort.

Les formules utilisées sont les suivantes :

(TARTULIER et BOURRET 1971 - 1972)

en mmHg

$$PAP_s = 0,0348 AQ + 0,1378 Q - 0,0084 A + 11,6936$$

$$PAP_d = 0,0157 AQ + 0,1074 Q + 0,0330 A + 1,6105$$

$$\overline{PAP} = 0,0268 AQ + 0,0052 Q + 0,0028 A + 6,2255$$

$$\overline{PCP} = 0,0256 AQ - 0,4869 Q - 0,0011 A + 3,3821$$

$$\overline{PAO} = 0,02375 AQ + 1,39850 Q - 0,01598 A + 87,55035$$

FVGtd= est assimilée à $\overline{PCP}$

- L'adaptation normale à l'effort du débit cardiaque

est estimée par les formules suivantes (age- V02 ml/mn)
(TARTULIER 1972)

$$Q \text{ L/mn} = - 0,0300 A + 0,0068 V02 + 6,0069$$

$$QaO2 \text{ ml/mn} = - 7,7355 A + 1,5809 V02 - 0,0038 A V02 + 1148,4263$$

V - Etude STATISTIQUE

- Appareil utilisé : calculatrice TEKTRONIK 31
- Nature des calculs : les valeurs moyennes et leurs écarts types sont comparés par le test T de STUDENT et une analyse de VARIANCE.

L'erreur standard de la moyenne (SE)
est estimée par le rapport :

$$\frac{\text{écart type}}{\sqrt{n}}$$

- éléments comparés : Ce mode de calcul comparatif est utilisé :
 - + pour comparer les valeurs réelles entre elles :
 - à l'état basal et sous oxygène
 - à l'état basal et à l'effort
 - + pour comparer les valeurs réelles à des valeurs théoriques ou à celles de sujets normaux du même âge.

- présentation des résultats :

- variation non significative p : NS
- Les différences significatives sont notées :

*	pour	p	<	0,05
**	pour	p	<	0,01
***	pour	p	<	0,001

Les corrélations partielles sont effectuées par série de 10 paramètres.

La relation qui unit chaque paramètre à un autre (coefficient de corrélation r) est significative

pour $n = 18$:

* $p < 0,05$ lorsque $r = 0,468$

** $p < 0,01$ lorsque $r = 0,589$

*** $p < 0,001$ lorsque $r = 0,708$

pour $n = 10$:

* lorsque $r = 0,632$

** lorsque $r = 0,764$

*** lorsque $r = 0,872$

RESULTATS A L'ETAT BASAL

n = 18

1) Données gazométriques et équilibre acidobasique

- PA O2 mmHg $\bar{X} = 84,8 \pm 14,9$ mmHg
 valeur normale : 100 mmHg
 valeur extrêmes : 54 et 105 mmHg

- Pa O2 mmHg $\bar{X} = 63,7 \pm 11,6$ mmHg
 valeurs normales : 80 à 85 mmHg

Les valeurs se répartissent de la manière suivante :

- au-delà de 80 mmHg : 1 cas (observation n° 5)
- entre 80 et 70 mmHg : 5 cas (observations n° 2
n° 4 - n° 6 - n° 12
n° 18)
- entre 70 et 60 mmHg : 5 cas (observations n° 1 - 8
10 - 11 - 15)
- entre 60 et 50 mmHg ; 5 cas (observations n° 3 - 7
13 - 16 - 17)
- entre 50 et 40 mmHg : 1 cas (observation n° 14)
- inférieures à 40 mmHg : 1 cas (observation n° 9)

- PA a O2 mmHg $\bar{X} = 21,1 \pm 11,4$ mmHg
 valeurs extrêmes : 12 et 42 mmHg
 (gradient normal inférieur à 25 mmHg)
 - 6 cas $>$ 25 mmHg
 (observations n° 7, 8, 10, 11, 13, 17)

- Sa O2 p cent $\bar{X} = 83,9 \pm 8,8$ %
 valeur normale $\geq$ 94 p cent
 (valeurs franchement pathologique :
 au-dessous de 85 p cent)

Les valeurs se répartissent de la manière suivante :

- 95 à 90 % : 6 cas (observations n° 2 - 4 - 5
6 - 12 - 18)
- 90 à 85 % : 3 cas (observations n° 8 - 11 - 13)

- 85 à 80 % : 6 cas (observations n° 1, 7, 10, 15, 16, 17)
- 80 à 75 % : 1 cas (observation n° 3)
- inférieur à 75 % : 2 cas (observations n° 9 et 14)

Au total 9 malades sur 18 avaient, au moment de l'hémodynamique, une désaturation oxyhémoglobinée importante.

* Sur les 18 malades, 3 seulement ont, à l'état basal, un pH acidosique

observation n° 3 pH = 7,245

observation n° 9 pH = 7,260

observation n° 15 pH = 7,33

* Concentration en ions H⁺ $\bar{X} = 41,8 \pm 5,8$ nano M/l

Dans 3 cas (H⁺) est supérieure à 45 mM/l (n° 3,9,15)
nanom/l

* CO₂ total plasmatique $\bar{X} = 29,65 \pm 4,99$ mEq /l

(valeur normale 25 mEq) Dans 15 ans la valeur de CO₂ dépasse 25

(observations n° 1,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18)

* Pa CO₂ $\bar{X} = 49,4 \pm 11,4$ mmHg

(valeur normale 37 à 43 mmHg)

Les valeurs notées pour les 18 malades se répartissent de la manière suivante :

- de 37 à 43 mmHg : 5 cas (observations n° 2,5,8,10,12)
- de 43 à 50 mmHg : 7 cas (observations n° 4,7,11,13,16,17,18)
- de 50 à 60 mmHg : 3 cas (observations n° 1 - 6 - 15)
- de 60 à 70 mmHg : 2 cas (observations n° 3 - 14)
- > 70 mmHg : 1 cas (observation n° 9)

2) DONNEES HEMODYNAMIQUEa) Hémodynamique métabolique

comparaison avec 14 sujets normaux du même âge

- <u>FC</u> c p m	$\bar{X}$	:	83,8	$\pm$	15,4
sujets normaux	$\bar{X}$	:	68,4	$\pm$	8,0
	P	:	N S		
- <u>$\dot{Q}$</u> l/min	$\bar{X}$	:	4,98	$\pm$	1,31
- <u>IC</u> l/min/m ²	$\bar{X}$	:	2,97	$\pm$	0,82
sujets normaux	$\bar{X}$	:	2,92	$\pm$	0,51
	P	:	N S		
- <u>VS</u> ml	$\bar{X}$	:	62,4	$\pm$	21
- <u>IS</u> ml/m ²	$\bar{X}$	:	37,1	$\pm$	12,1
sujets normaux	$\bar{X}$	:	43	$\pm$	5,3
	P	:	*		
- <u>Cap O₂</u>	$\bar{X}$	:	20,32	$\pm$	2,26
sujets normaux	$\bar{X}$	:	18,26	$\pm$	1,19
	P	:	*		
- <u>Sa O₂</u> p cent	$\bar{X}$	:	83,9	$\pm$	8,8
sujets normaux	$\bar{X}$	:	95,7	$\pm$	2,0
	P	:	* * *		
- <u>SvO₂</u> p cent	$\bar{X}$	:	59,28	$\pm$	7,06
sujets normaux	$\bar{X}$	:	71,79	$\pm$	2,55
	P	:	* * *		
- <u>CaO₂</u> vol p cent	$\bar{X}$	:	16,84	$\pm$	2,4
sujets normaux	$\bar{X}$	:	17,26	$\pm$	1,1
	P	:	N S		
- <u>CvO₂</u> vol p cent	$\bar{X}$	:	11,85	$\pm$	1,9
sujets normaux	$\bar{X}$	:	12,79	$\pm$	1,1
	P	:	*		

- $\Delta a \bar{V}O_2$ vol p cent	$\bar{X}$	:	4,95	$\pm$	1,1
sujets normaux	$\bar{X}$	:	4,48	$\pm$	0,55
	P	:	N S		
- $\Delta a VO_2$ p cent	$\bar{X}$	:	29,3	$\pm$	5,65
CaO_2					
sujets normaux	$\bar{X}$	:	26,0	$\pm$	3,1
	P	:	*		
- $\dot{Q}aO_2$ ml/min	$\bar{X}$	:	494	$\pm$	131
sujets normaux	$\bar{X}$	:	505	$\pm$	91
	P	:	N S		
- $\dot{Q}\bar{V}O_2$ ml/min	$\bar{X}$	:	353	$\pm$	120
sujets normaux	$\bar{X}$	:	376	$\pm$	83
	P	:	N S		

Par rapport à 14 sujets normaux du même âge (in thèse GALLET LYON 1972) les 18 patients, qui font l'objet de cette étude, se caractérisent significativement par une augmentation de la capacité oxyphorique et du taux d'extraction d'oxygène et une diminution de la saturation artérielle et veineuse mêlée en oxygène, une diminution du contenu veineux en oxygène.

Par contre, la comparaison des débits cardiaques et des débits d'oxygène disponible et inutilisé ($Qa O_2$ et $\dot{Q}\bar{V} O_2$) ne met en évidence aucune différence significative avec la série de 14 sujets normaux du même âge.

b) Hémodynamique du coeur droit et de la
circulation pulmonaire

POD $\bar{X}$: 0,7 $\pm$ 1,9
(valeur normale inférieure à 4 mmHg)

PVDS $\bar{X}$: 36,2 $\pm$ 18,7

PVDtd $\bar{X}$: 3,0 $\pm$ 2,96
valeur normale < 8 mmHg

PAPS $\bar{X}$: 41,17 $\pm$ 19,5
valeur théorique

$\bar{X}$: 22,45 $\pm$ 4,5

P : * * *

PAPd $\bar{X}$: 15,4 $\pm$ 10

valeur théorique

$\bar{X}$: 9,5 $\pm$ 1,5

P : *

PAP $\bar{X}$: 26,25 $\pm$ 14,1

valeur théorique

$\bar{X}$: 15,0 $\pm$ 2,2

P : * * *

PCP $\bar{X}$: 4,58 $\pm$ 3,1

valeur théorique

$\bar{X}$: 9,11 $\pm$ 1,5

P : * * *

Δ PAP - PCP

$\bar{X} : 21,7 \pm 14,6$

valeur théorique

$\bar{X} : 5,9 \pm 0,75$

P : * * *

RPT dynes/sec/ cm^5

$\bar{X} : 456,2 \pm 280$

valeur théorique

$\bar{X} : 248,6 \pm 31$

P : * *

RAP dynes/sec/cm $^{-5}$

$\bar{X} : 376,8 \pm 284$

valeur théorique

$\bar{X} : 87 \pm 31,8$

P : * * *

travail systolique gm/m²

ventriculaire droit

$\bar{X} : 12,29 \pm 5,57$

14 sujets normaux

$\bar{X} : 9,12 \pm 2,17$

P : * *

AU TOTAL

* Par rapport aux 14 sujets normaux ou aux valeurs théoriques (cf mode de calcul exposé dans le protocole) les 18 malades se caractérisent de la manière suivante :

- 1) La compétence ventriculaire droite est satisfaisante au moment de l'étude hémodynamique :

$\bar{X}$: P $\overline{OD}$ inférieure à 4 mmHg

sauf 2 cas (observations 9 et 15)

(4 et 4,5 mmHg respectivement)

* PVDtd inférieure à 8 mmHg

sauf 2 cas (observations 3 et 8)

(11 et 8 mmHg respectivement)

- 2) - Les pressions artérielles pulmonaires systoliques, diastoliques et moyennes sont très significativement élevées.
- 3) - De même, le gradient artériocapillaire pulmonaire et les résistances artériolaires pulmonaires sont nettement augmentés
- 4) - Les pressions capillaires pulmonaires moyennes sont normales, inférieures aux valeurs théoriques estimées.
- 5) - Le travail systolique ventriculaire droit, par m² de surface corporelle est accru pour l'ensemble du groupe, mais il est normal dans 9 cas.
(observations n° 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 16)

c) Hémodynamique du coeur gauche et de l'aorte

PAoS mmHg $\bar{X}$: 122 $\pm$ 20,9
valeurs extrêmes à 95 et 170

PAod mmHg $\bar{X}$: 65,3 $\pm$ 8,9
valeurs extrêmes à 50 et 80

PAo mmHg $\bar{X}$: 90,1 $\pm$ 10,7
valeur théorique
 $\bar{X}$: 101,1 $\pm$ 3,7
P : * * *

les valeurs réelles sont pour l'ensemble du groupe
significativement plus basses que les valeurs
théoriques ; 3 sujets présentent néanmoins une
élévation anormale de la pression systémique
(observations n° 6, 13, 18)

PVGS mmHg $\bar{X}$: 119,5 $\pm$ 15,4

PVGtd mmHg $\bar{X}$: 5,6 $\pm$ 4,4

valeur normale < 12 mmHg

2 cas supérieurs à 12 mmHg : 12 et 18 mmHg respectivement
(observations n° 3, 8)

Résistances artérielles systémiques dynes/s/cm -5

$\bar{X}$: 1535 $\pm$ 419
valeur théorique
 $\bar{X}$: 1714 $\pm$ 387
P : * * *

travail systolique ventriculaire gauche gm/m2

$\bar{X}$: 59 $\pm$ 22

valeurs extrêmes 28 et 103

14 sujets normaux

$\bar{X}$: 60,93 $\pm$ 9,07

P : N S

valeurs extrêmes des

14 sujets normaux : 44,8 et 81,8

temps d'éjection ms

$\bar{X}$: 265,9 $\pm$ 34,7

soit en moyenne = 95 $\pm$ 8,9 p cent de la valeur théorique

dp/dt mmHg s

$\bar{X}$: 1558 $\pm$ 353

valeurs normales : 1200 à 2000

2 cas inférieurs à 1200 (observations 8 et 17)

dp/dt cycles/s

PI $\bar{X}$: 28,42 $\pm$ 8,36

valeurs normales : 20 à 30

1 cas inférieur à 20 (observation n° 8)

AU TOTAL

- la circulation systémique est normale
à l'exception de 3 malades présentant une discrète
élévation de $\overline{PAo}$ (observations 6, 13, 18)
- la PVGtd est normale sauf dans 2 cas
(observations 3, 8)
- les résistances artérielles systémiques sont plus
basses que les valeurs théoriques maximales
- le travail systolique ventriculaire gauche n'est pas
différent de celui de la série de 14 sujets normaux du
même âge quant à la moyenne du groupe, cependant il est
abaissé dans 6 cas (observations 5, 7, 8, 14, 15, 16)
(inférieur à 40 gm/m²)
- le temps d'éjection est sensiblement normal

* $\frac{dp}{dt}$ est normal sauf dans 2 cas (observations 8 et 17)
où il est abaissé

* $\frac{dp}{dt}$
 $\frac{PI}{PI}$ est normal sauf dans 1 cas (observation n° 8) où
il est abaissé

Pour la majorité des malades, la performance ventriculaire gauche peut être considérée comme satisfaisante : fonction pompe, compliance, contractilité.

3) CORRELATIONS

Dans les tableaux de corrélations qui vont suivre, l'index cardiaque et la fréquence cardiaque n'apparaissent pas. Ces paramètres ont fait l'objet d'une étude systématique et dans aucun cas ils n'ont obtenu de corrélation significative.

a) Pressions droites et gaz du sang n = 18

	$\overline{PAP}$	$\overline{PCP}$	$\overline{PAP} - \overline{PCP}$	H +	Pa CO ₂	100-Sa O ₂
$\overline{PAP}$		- 0,008	0,977***	0,481	0,631**	0,746***
$\overline{PCP}$			- 0,292	0,170	- 0,008	- 0,215
$\overline{PAP} - \overline{PCP}$				0,418	0,629**	0,761***
H +					0,734***	0,536*
Pa CO ₂						0,891***

- La pression capillaire pulmonaire moyenne est indépendante de la pression artérielle pulmonaire.

. La pression artérielle pulmonaire moyenne est étroitement corrélée avec le gradient artériocapillaire ($\overline{PAP} - \overline{PCP}$). Cette constatation souligne le mécanisme physiopathologique de l'HTAP précapillaire.

. $\overline{PAP}$ et $\overline{PAP} - \overline{PCP}$ sont étroitement corrélés avec les perturbations gazométriques (désaturation et Pa CO₂).

La corrélation qui existe entre la désaturation en oxygène et la capnie (traduisant l'hypoventilation alvéolaire) explique les corrélations précédentes.

Pour une même saturation oxyhémoglobinée, la pression artérielle pulmonaire moyenne est étudiée en fonction de la concentration en ions H^+ (nanomoles/l) et de la désaturation oxyhémoglobinée.

La relation liant $\overline{PAP}$ à la désaturation oxyhémoglobinée et aux ions H^+ est la suivante :

$$\overline{PAP} \text{ mmHg} = - 1,744 + 1,100 (100 - Sa O_2) + 0,247 (H^+)$$

Le coefficient de corrélation est : $r = 0,750 ***$


(estimation de l'erreur standard = 9,9).

Sur le diagramme de la page 89 on note que la $\overline{PAP}$ s'élève de :

- 1) 11 mmHg pour 10 % de désaturation oxyhémoglobinée,
- 2) une élévation de 2,5 mmHg de $\overline{PAP}$ pour 10 nano M/l d' H^+ supplémentaires.

Cette corrélation souligne le rôle prépondérant de l'hypoxémie sur l'HTAP.

PAP mmHg



b) Pressions gauches et gaz du sang n = 12

	P V G S	PVG td	H+	Pa CO ₂	100 - SaO ₂
<u>PAo</u>		0,143	- 0,108	- 0,325	- 0,387
PVGS		0,310	- 0,07	- 0,424	- 0,685**
PVG td			0,144	0,123	- 0,144
H +				0,734***	0,536*
Pa CO ₂					0,891

On ne note aucune incidence particulière des gaz du sang et de l'équilibre acidobasique sur la pression de remplissage ventriculaire gauche.

Il existe une relation négative faiblement significative entre la pression systolique VS et le taux de désaturation. L'explication en est malaisée. On peut toutefois estimer qu'à mesure que l'hypoxémie progresse, l'HTAP satellite s'accompagne d'une diminution du débit cardiaque et du volume systolique pouvant entraîner une diminution de la pression systolique VG.

D'ailleurs comme on le verra dans le chapitre suivant, il existe une corrélation en négative entre PVGS et le gradient $\overline{PAP} - \overline{PCP}$.

c) Pressions gauches et pressions droites $n = 18$

	PVGS	PVG td	PCP	PAP	$\frac{PAP}{PCP}$	PVD td
$\overline{PAo}$		0,143	0,178	- 0,157		0,001
PVGS		0,267	0,542*	- 0,503*	- 0,629*	-
PVG td			0,623**	0,005	- 0,02	0,655**
$\overline{PCP}$				- 0,008	- 0,292	0,421
$\overline{PAP}$					0,977***	0,300

• Il existe un lien ** entre PVGtd et $\overline{PCP}$ confirmant la fiabilité de l'estimation de PVG td par $\overline{PCP}$.

• Le lien ** existant entre PVGtd et PVDtd est insolite.

Il est difficile d'en donner une explication satisfaisante.

d) Indices de contractilité ventriculaire gauche et
gaz du sang
pressions droites
pressions gauches
n = 18

	$\frac{dp}{dt}$ PI	Pa CO ₂	H+	100 Sa O ₂	PCP	PAP	PAo	PVGS	PVG td
dp/dt	*** (0,934)	0,303	0,160	0,247	-0,344	0,253	x	0,001	(-0,536)*
$\frac{dp/dt}{P I}$		0,302	0,187	0,289	-0,399	0,241	x	-0,132	(-0,531)*
Pa CO ₂			(0,734)***	(0,891)***	-0,08	(0,631)*	-0,325	(-0,493)*	-0,140
H +				(0,536)*	0,170	(0,481)*	-0,108	-0,147	0,144
100 Sa O ₂					-0,215	(0,746)***	-0,387	(-0,668)*	-0,144
PCP						-0,00	0,178	(0,542)*	(0,536)*
PAP							-0,157	(-0,503)*	0,005
PAo									0,143
PVGS									0,267

* Les indices de la contractilité ventriculaire gauche sont :

- indépendants des facteurs gazométriques sanguins
- indépendants des pressions droites
- indépendants de la PVGS
- en revanche ils sont faiblement corrélés à la PVGtd

4) COMPARAISONS

Etude comparative de la fonction ventriculaire gauche chez

A) 8 SUJETS comportant un risque vasculaire (Groupe A)

et

10 SUJETS sans facteur de risque vasculaire connu (Groupe B)

Les observations composant ce groupe sont les suivantes :

n° 1 2 5 6 12 13 16 18

Ce groupe particulier est composé de malades

- porteurs d'HTA discrète au repos dans 3 cas
révélée à l'effort dans 2 cas
- de diabète gras (1 cas)
- de coronaropathie (3 cas) dont 2 avec antécédents d'infarctus
myocardique

L'observation n° 18 présente à la fois des antécédents de coronaropathie et une HTA discrète au repos.

Enfin, 3 malades, cités dans ce groupe, ont en outre des antécédents d'IVD (observations n° 6, 12, 16)

La fonction ventriculaire gauche et ses indices de performance : pompe, compliance, contractilité est étudiée en fonction des données gazométriques et de la postcharge.

Les données obtenues dans ces conditions sont comparées aux 10 observations restantes, indemnes de risque vasculaire connu.

a - Les conditions gazométriques et l'équilibre acidobasique* SaO2 p cent

$$\bar{X} = 88,6 \pm 5,2$$

$$\bar{X} = 80,3 \pm 9,6$$

$$P : *$$

* PaCO2 mmHg

$$\text{Groupe A } \bar{X} = 45 \pm 6,4$$

$$\text{Groupe B } \bar{X} = 53 \pm 13,5$$

$$P : \text{ N S}$$

* H+ nano moles/l

$$\text{Groupe A } \bar{X} = 41,25 \pm 1,41$$

$$\text{Groupe B } \bar{X} = 43,01 \pm 6,5$$

$$P : \text{ N S}$$

b - Conditions pressionnelles droites* PAP mmHg

$$\text{Groupe A } \bar{X} = 17,6 \pm 4,8$$

$$\text{Groupe B } \bar{X} = 30,2 \pm 18,4$$

$$P : *$$

valeur théorique

$$\bar{X} = 15,0 \pm 2,2$$

* travail systolique ventriculaire droit gm/m2

$$\text{Groupe A } \bar{X} = 8,75 \pm 2,89$$

$$\text{Groupe B } \bar{X} = 15,87 \pm 9,14$$

$$P : *$$

c) Conditions pressionielles gauches

* PCP mmHg

Groupe A	$\bar{X} = 5,13 \pm 3,61$
Groupe B	$\bar{X} = 4,15 \pm 2,75$
P	: N S
valeur théorique $\bar{X}$	$= 9,11 \pm 1,5$

* PVGS mmHg

Groupe A	$\bar{X} = 130,3 \pm 14,1$
Groupe B	$\bar{X} = 113,0 \pm 11,1$
P	: * *

Groupe A

* PVGtd mmHg

Groupe B	$\bar{X} = 5,54 \pm 3,12$
	$\bar{X} = 5,70 \pm 5,39$
P	: N S

* résistances artérielles systémiques dynes/s/cm-5

Groupe A	$\bar{X} = 1678 \pm 442$
Groupe B	$\bar{X} = 1421 \pm 384$
P	: N S

* travail systolique ventriculaire gauche gm/m2

Groupe A	$\bar{X} = 64,88 \pm 23,25$
Groupe B	$\bar{X} = 53,70 \pm 21,29$
P	: N S

f) Indices de contractilité V G* $\frac{dp}{dt}$

Groupe A	$\bar{X}$	=	1559	$\pm$	194
Groupe B	$\bar{X}$	=	1557	$\pm$	394
P	:	N S			

* $\frac{dp}{dt} / PI$

Groupe A	$\bar{X}$	=	27,8	$\pm$	3,9
Groupe B	$\bar{X}$	=	28,9	$\pm$	6,9
P	:	N S			

EN CONCLUSION

La fonction ventriculaire gauche observée chez 8 malades, présentant un facteur de risque cardiovasculaire systémique peut être considérée comme satisfaisante en ce qui concerne les pressions, le travail systolique et les indices de contractilité.

Elle est en tout point comparable à la performance ventriculaire gauche, des autres malades atteints de BPCO.

Il convient de souligner que ce groupe de 8 malades présentant un facteur de risque vasculaire systémique n'est affecté que de perturbations gazométriques mineures et de modifications pressionnelles pulmonaires discrètes.

Dans ces conditions, il est difficile d'interpréter les données de la fonction ventriculaire gauche chez de tels malades.

B) ETUDE DE LA FONCTION VENTRICULAIRE GAUCHE CHEZ
 10 MALADES AYANT DES ANTECEDENTS D'IVD
 comparée à celle de 8 sujets indemnes d'antécédents
 d' I V D

Les 10 observations retenues sont celles qui
 constituent le GROUPE I : n° 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
 16, 17

$$n = 10$$

La présence d'antécédents d'IVD risque-t-elle de
 retentir sur la fonction ventriculaire gauche ?

Les critères de comparaison sont les mêmes que
 ceux retenus dans l'étude concernant les 8 malades à risque
 vasculaire.

Il faut noter que les malades :

- n° 16 présente une HTA discrète au repos
 - n° 12 une HTA révélée à l'effort
 - n° 16 est porteur d'une coronaropathie avec
des antécédents d'infarctus du myocarde
-

Les résultats obtenus sont comparés aux 8 sujets
 (n = 8)
 indemnes d'antécédents de décompensation cardiaque

a) Conditions gazométriques et équilibre acidobasique* SaO₂ p cent

Groupe I	$\bar{X} = 80,6$	$\pm$	10,1
Groupe II	$\bar{X} = 88,1$	$\pm$	4,8
P :	*		

* PaCO₂ mmHg

Groupe I	$\bar{X} = 53,4$	$\pm$	13,6
Groupe II	$\bar{X} = 44,5$	$\pm$	5,3
P :	*		

* H⁺ nanomoles/l

Groupe I	$\bar{X} = 43,8$	$\pm$	5,5
Groupe II	$\bar{X} = 39,15$	$\pm$	1,6
P :	*		

b) Conditions pressionielles droites* PAP mmHg

Groupe I	$\bar{X} = 33,7$	$\pm$	15,0
Groupe II	$\bar{X} = 17,0$	$\pm$	3,9
P :	* *		

* travail systolique ventriculaire droit gm/m2

Groupe I	$\bar{X}$	=	16,3	$\pm$	8,8
Groupe II	$\bar{X}$	=	8,1	$\pm$	2,3
	P	:	* *		
14 sujets normaux	$\bar{X}$	=	9,12	$\pm$	2,17
Groupe I	$\bar{X}$	=	16,32	$\pm$	8,82
	P	:	* *		
14 sujets normaux	$\bar{X}$	=	9,12	$\pm$	2,17
Groupe II	$\bar{X}$	=	8,18	$\pm$	2,33
	P	:	N S		

c) Conditions pressionnelles gauches

* PCP mmHg

Groupe I	$\bar{X}$	=	4,85	$\pm$	3,37
Groupe II	$\bar{X}$	=	4,25	$\pm$	2,93
	P	:	N S		

* PVGS mmHg

Groupe I	$\bar{X}$	=	115,5	$\pm$	15,0
Groupe II	$\bar{X}$	=	127,2	$\pm$	13,1
	P	:	N S		

* PVGtd mmHg

Groupe I	$\bar{X}$	=	6,85	$\pm$	5,36
Groupe II	$\bar{X}$	=	4,1	$\pm$	2,32
	P	:	N S		

* travail systolique ventriculaire gauche gm/m2

Groupe I	$\bar{X}$	=	56,4	$\pm$	23,2
Groupe II	$\bar{X}$	=	61,5	$\pm$	22,21
	P	:	N S		

* PAo

Groupe I	$\bar{X} = 88,9 \pm 10,7$
Groupe II	$\bar{X} = 91,6 \pm 11,1$
P :	N S

* Résistance artérielle systémique dynes/cm-5/sec

Groupe I	$\bar{X} = 1473 \pm 421$
Groupe II	$\bar{X} = 1613 \pm 432$
P :	N S

Indice de contractilité* dp/dt mmHg s

Groupe I	$\bar{X} = 1490 \pm 336$
Groupe II	$\bar{X} = 1643 \pm 378$
P :	N S

* dp / dt / PI cycles s-1

Groupe I	$\bar{X} = 26,7 \pm 7,5$
Groupe II	$\bar{X} = 30,6 \pm 9,4$
P :	N S

EN CONCLUSION

En comparant 10 patients ayant des antécédents d'IVD à 8 malades sans antécédents d'IVD, les différences portent essentiellement sur

- l'hypertension artérielle pulmonaire
- l'accroissement du travail systolique ventriculaire droit,

conditions gazométriques, davantage perturbées dans le groupe I.

En revanche, la fonction ventriculaire gauche n'apparaît pas différente de celle observée dans l'autre groupe.

II - EXERCICE MUSCULAIRE

10 malades ont réalisé un effort de 20 à 40 Watts pendant 10 minutes, dont les conditions sont précisées dans le protocole.

Il s'agit des observations n°s

1,2,3,4,11,12,13,15,17,18.

1) Données gazométriques équilibre acidobasique

PAO₂ mmHg

état basal	$\bar{X}$:	87,3	$\pm$	9,7
valeurs extrêmes	$\bar{X}$:	68	et	99
effort	$\bar{X}$:	92,0	$\pm$	10,6
valeurs extrêmes	$\bar{X}$:	72	et	112

augmentation significative

P : *

PaO₂ mmHg

état basal	$\bar{X}$:	66,3	$\pm$	8,6
valeurs extrêmes	$\bar{X}$:	56,5	et	77,8
effort	$\bar{X}$:	63,5	$\pm$	11,8
valeurs extrêmes	$\bar{X}$:	52	et	78

diminution significative

P : *

PAaO₂ mmHg

état basal	$\bar{X}$:	21,5	$\pm$	10,5
valeurs extrêmes	$\bar{X}$:	12	et	39
effort	$\bar{X}$:	28,5	et	10,1
valeurs extrêmes	$\bar{X}$:	19	et	47

augmentation significative

P : *

SaO₂ pour cent

état basal	$\bar{X}$	:	86,45	$\pm$	5,03
valeurs extrêmes	$\bar{X}$	:	77,5	et	92,5
effort	$\bar{X}$	:	84,40	et	8,12
valeurs extrêmes	$\bar{X}$	:	69,5	et	93

diminution non significative

P : NS

H⁺ nano m/l

état basal	$\bar{X}$	:	42,77	$\pm$	5,4
valeurs extrêmes	$\bar{X}$	:	38,4	et	56,9
effort	$\bar{X}$	:	50,73	$\pm$	9,1
valeurs extrêmes	$\bar{X}$	:	42,2	et	74,1

augmentation très significative

P : ***

PaCO₂ mmHg

état basal	$\bar{X}$	:	47,8	$\pm$	7,9
valeurs extrêmes	$\bar{X}$	:	38	et	66
effort	$\bar{X}$	:	50,5	$\pm$	11,6
valeurs extrêmes	$\bar{X}$	:	34	et	77

augmentation non significative

P : NS

AU TOTAL

Malgré l'amélioration de la ventilation alvéolaire (augmentation PAO_2), l'hypoxie (diminution PaO_2) est plus marquée et s'accompagne d'une acidose essentiellement métabolique.

La capnie ne fait l'objet d'aucune variation significative.

+ l'hypoxémie est aggravée dans 6 cas sur 10

(observations n°s 1,3,6,7,8,9)

améliorée dans 4 cas sur 10

(observations n°s 2,4,5,10)

+ l'hypercapnie est aggravée dans 8 cas sur 10

(observations n°s 1,3,4,5,6,7,8,9)

améliorée dans 2 cas sur 10

(observations n°s 2 et 10)

2) Données hémodynamiques

a) hémodynamique métabolique

FC/ min

état basal	$\bar{X}$	:	78,6	$\pm$	10,6
effort	$\bar{X}$	:	117,2	$\pm$	16,3
	P	:	***		

augmentation très significative de la FC

VO₂/ m²

état basal	$\bar{X}$	:	146,3	$\pm$	14,9
effort	$\bar{X}$	:	477,3	$\pm$	110
	P	:	***		

augmentation très significative

$\dot{Q}$ l/min

état basal	$\bar{X}$	:	5,52	$\pm$	1,27
effort	$\bar{X}$	:	11,43	$\pm$	2,75
	P	:	***		

augmentation très significative

IC l/min/m²

état basal	$\bar{X}$	:	3,18	$\pm$	0,76
effort	$\bar{X}$	:	6,61	$\pm$	1,76
	P	:	***		

augmentation très significative

IS cc/m²

état basal	$\bar{X}$	:	42,1	$\pm$	11,2
effort	$\bar{X}$	:	56,6	$\pm$	11,6
P : **					

augmentation significative

CapO₂ pour cent

état basal	$\bar{X}$	:	20,67	$\pm$	2,52
effort	$\bar{X}$	:	22,01	$\pm$	2,87
P : ***					

augmentation très significative

SaO₂ pour cent

état basal	$\bar{X}$	:	86,45	$\pm$	5,03
effort	$\bar{X}$	:	84,40	$\pm$	8,12
P : NS					

diminution non significative

SvO₂ pour cent

état basal	$\bar{X}$	:	63	$\pm$	3,65
effort	$\bar{X}$	:	50,5	$\pm$	4,0
P : ***					

diminution très significative

CaO₂ vol pour cent

état basal	$\bar{X}$: 17,62	$\pm$	1,8
effort	$\bar{X}$: 18,20	$\pm$	1,7

P : *

augmentation significative

QvO₂ vol pour cent

état basal	$\bar{X}$: 12,8	$\pm$	1,50
effort	$\bar{X}$: 10,86	$\pm$	1,32

P : ***

diminution très significative

a $\bar{v}$ O₂ pour cent

état basal	$\bar{X}$: 4,76	$\pm$	0,91
effort	$\bar{X}$: 7,34	$\pm$	0,87

P : ***

augmentation très significative

a $\bar{v}$ O₂ pour centCaO₂

état basal	$\bar{X}$: 27,05	$\pm$	4,39
effort	$\bar{X}$: 40,39	$\pm$	3,78

P : ***

augmentation très significative

b) Hémodynamique : pressions droitesPAPS mmHgétat basal $\bar{X} = 34,25 \pm 13,7$ effort $\bar{X} = 62,1 \pm 30,8$

P : ***

augmentation très significative

PAPd mmHgétat basal $\bar{X} = 11,95 \pm 7$ effort $\bar{X} = 26,4 \pm 16,3$

P : ***

augmentation très significative

PAP mmHgétat basal $\bar{X} = 21,45 \pm 11,6$ (théor. max $\bar{X} = 15,85 \pm 1,9$ ***)effort $\bar{X} = 42,2 \pm 20,2$ (théor. max $X = 26,1 \pm 5,0$ ***)

P : ***

augmentation très significative

PCP mmHgétat basal $\bar{X} = 4,4 \pm 2,7$ (théor. max $X = 9,64 \pm 1,3$ ***)effort $\bar{X} = 15,85 \pm 8,5$ (théor. max $X = 16,51 \pm 3,6$ NS)

P : ***

augmentation très significative

PAP - PCP mmHg

état basal $\bar{X} = 17,9 \pm 11,5$ (théor. max $\bar{X} = 6,2 \pm 0,7$ ***)

effort $\bar{X} = 26,4 \pm 18,4$ (théor. max $X = 9,57 \pm 1,5$ ***)

P : NS

augmentation non significative

RPT dynes/s/cm-5

état basal $\bar{X} = 336,3 \pm 226$ (théor. max $X = 234,9 \pm 27$ ***)

effort $\bar{X} = 311,5 \pm 173$ (théor. max $X = 185 \pm 18$ ***)

P : NS

diminution non significative

RAP dynes/cm-5/sec

état basal $\bar{X} = 268,7 \pm 220,5$ (théor. max $\bar{X} = 92,1 \pm 10,5$ ***)

effort $\bar{X} = 197,3 \pm 163,9$ (théor. max $\bar{X} = 68 \pm 6,5$ ***)

P : NS

diminution non significative

Travail systolique ventriculaire droit gm/m2

état basal $\bar{X} = 9,54 \pm 3,57$

effort $\bar{X} = 26,68 \pm 14,6$

P : ***

augmentation très significative

AU TOTAL

Les pressions droites (PAP et PCP) sont augmentées à l'effort de façon très sensible.

Le travail systolique ventriculaire droit est triplé lors de la réalisation de l'effort.

En fait l'élévation des $\overline{\text{PCP}}$ n'est pas significativement différente de celle de sujets normaux du même âge, à l'exception de 2 cas

où PCP dépasse 20 mmHg et peut être considéré comme pathologique (obs n° 3 et 18).

Quant à la pression artérielle pulmonaire moyenne, son élévation est significative à l'effort par rapport à l'état basal mais aussi par rapport aux valeurs théoriques (calculées en fonction de l'âge et du débit cardiaque) à l'état basal et à l'effort.

Le gradient artériocapillaire pulmonaire ne subit pas d'élévation significative à l'effort. Cependant à l'état basal comme à l'effort il est très significativement élevé par rapport aux valeurs théoriques.

c) Hémodynamique pressions gauchesPAoS mmHg

repos $\bar{X} = 126,5 \pm 16$
 effort $\bar{X} = 169,5 \pm 34,5$
 P : * * *

élévation très significative à l'effort

PAOd mmHg

repos $\bar{X} = 68,0 \pm 5,4$
 effort $\bar{X} = 88,5 \pm 9,0$
 P : * * *

élévation très significative

PAO mmHg

repos $\bar{X} = 92,9 \pm 8,5$ (théor.max X $102,6 \pm 3,3$ NS)
 effort $\bar{X} = 122,5 \pm 21,8$ (théor.max X $120,1 \pm 8,2$ NS)
 P : * * *

élévation très significative

PVGS mmHg

repos $\bar{X} = 125,5 \pm 12,6$
 effort $\bar{X} = 171,3 \pm 36,8$
 P : * * *

élévation très significative

PVGtd mmHg

repos $\bar{X} = 4,37 \pm 3,3$ (théor.max $X=2,93 \pm 1,82$: NS)

effort $\bar{X} = 14,4 \pm 7,4$ (théor.max $\bar{X}=13,9 \pm 4,2$: NS)

P : * * *

chez 2 malades la PVGtd est supérieure à 20
(Obs.n°2 et 18)

élévation très significative

P : * * *

W systolique externe VG gm/m2

repos $\bar{X} = 68,7 \pm 21,3$

effort $\bar{X} = 119,1 \pm 30,9$

P : * * *

élévation très significative

Résistances artérielles systémiques dynes/s/cm-5

repos $\bar{X} = 1414 \pm 387$

effort $\bar{X} = 900 \pm 249$

P : * * *

diminution très significative

temps d'éjection MS

repos $\bar{X} = 281 \pm 29$

effort $\bar{X} = 241 \pm 29$

P : * *

diminution significative à l'effort

taux d'éjection l/m2

repos $\bar{X} = 0,149 \pm 0,04$

effort $\bar{X} = 0,236 \pm 0,05$

P : * * *

élévation très significative


(valeur normale supérieure à 0,150 l/m2 à l'état basal)
($\pm 0,014$)
()


COURBE DE FONCTION
VENTRICULAIRE GAUCHE

travail **systolique** externe
ventriculaire gauche

P V G td

état basal	r	:	0,129
effort	r	:	0,679





AU TOTAL

Toutes les pressions gauches sont augmentées au cours de l'effort, de même que le travail systolique externe et le taux d'éjection.

Les résistances artérielles systémiques diminuent.

La durée de l'éjection s'abrège sensiblement.

Tous ces résultats sont conformes aux données classiques de l'adaptation cardiovasculaire à l'effort.

Si l'on compare l'hémodynamique du coeur gauche des 10 malades, on constate :

- qu'à l'état basal les pressions sont sensiblement normales (avec une pression capillaire pulmonaire normale). Toutefois, 2 HTA discrètes sont à signaler.

Les résistances artérielles systémiques ne sont pas différentes des valeurs théoriques.

- qu'à l'effort, se manifestent 2 nouvelles HTA (observations n° 2 et 12).

La $\overline{PCP}$ subit une élévation franche correspondant à l'élévation de la PVGtd. En fait, cette élévation est normale en fonction de l'âge et du débit cardiaque des malades, sauf dans 2 cas où elle est pathologique (observations n° 3 et 18).

Les $\overline{PAo}$ sont anormalement élevées dans 3 cas sur 18 à l'état basal et dans 4 cas sur 10 à l'effort.

3 - CORRELATIONS A L'EFFORT

a) pressions droites et gaz du sang n = 10

	PCP	H+	PaCO ₂	100-SaO ₂
PAP	0,417	0,725*	0,755*	0,882***
PCP		0,730*	0,534	0,454
H +			0,803**	0,787**
PaCO ₂				0,872***

Comme à l'état basal :

La $\overline{\text{PAP}}$ est indépendante de :

- la pression capillaire pulmonaire,
- elle est étroitement corrélée avec la désaturation, la capnie et la (H+).

La corrélation $\overline{\text{PCP}}/(\text{H}^+)$ apparaît fortuite : probablement liée au fait que, lors de l'effort, $\overline{\text{PCP}}$ et (H+) augmentent dans le même sens.

b) pressions gauches et gaz du sang n = 10

	PVGtd	H+	PaCO ₂	100-SaO ₂
PAo	0,587	- 0,002	- 0,380	- 0,188
PVGtd		0,127	- 0,210	- 0,107
H +			** 0,803	** 0,787
PaCO ₂				*** 0,872

* Les paramètres concernant le VG et la pression systémique ne sont pas affectés par les variations des gaz du sang au cours de l'épreuve d'effort.

Les seules corrélations notées concernent les gaz du sang entre eux et les ions H⁺.

c) pressions gauches et pressions droites n = 10

	PVG td	PCP	PAP
PAo	0,587	0,142	0,069
PVGtd		0,639 *	- 0,019
PCP			0,417

La PAP est indépendante de PVGtd.

En revanche, on retrouve au cours de l'effort, la constatation faite à l'état banal d'une corrélation entre PVGtd et PCP.

Il n'y a, d'autre part, pas de liaison significative entre PVGtd et PAo.

III - INHALATION D'OXYGENE PUR n = 18

Les 18 malades ont inhalé de l'oxygène pur pendant 20 minutes.

Les mesures ventilatoires, gazométriques et hémodynamiques pratiquées dans ces conditions sont comparées aux valeurs basales recueillies en air ambiant et aux valeurs théoriques (dont le mode de calcul est précisé dans le protocole).

A - VENTILATION - AIR- O₂

/ V 1 /mn

AIR $\bar{X}$: 8,002 $\pm$ 2,013
valeurs extrêmes : 4,220 et 11,455

O₂ $\bar{X}$: 6,89 $\pm$ 1,69
valeurs extrêmes : 4,589 $\pm$ 10,790

p : **

significativement diminuée sous O₂

/ Vc 1

AIR $\bar{X}$: 0,447 $\pm$ 0,176

O₂ $\bar{X}$: 0,364 $\pm$ 0,145

p : *

diminution significative sous O₂

/ VA 1/mn

AIR $\bar{X}$: 3,31 $\pm$ 0,91

O₂ $\bar{X}$: 2,88 $\pm$ 0,93

p : ***

diminution très significative sous O₂

/ EMP 1

AIR $\bar{X}$: 0,253 $\pm$ 0,073

O₂ $\bar{X}$: 0,206 $\pm$ 0,077

p : *

diminution significative

/ VA/V %

AIR	$\bar{X}$	:	41,74	$\pm$	9,1
O ₂	$\bar{X}$	:	42,6	$\pm$	9,0
		p	:	NS	

élévation non significative

/ FR / mn

AIR	$\bar{X}$	:	20	$\pm$	8
O ₂	$\bar{X}$	:	20,5	$\pm$	6
		p	:	NS	

élévation non significative

EN RESUME :

On note une diminution significative de la ventilation pulmonaire totale et de la ventilation alvéolaire.

Les conséquences de ce phénomène sur les gaz du sang seront étudiées dans le chapitre suivant.

B) Echanges gazeux pulmonaires équilibre acido-basique

Données gazométriques

/ PA O₂ mmHg

AIR	$\bar{X}$	:	84,8	$\pm$	14,9
-----	-----------	---	------	-------	------

valeurs extrêmes	:	54	et	105
------------------	---	----	----	-----

O ₂	$\bar{X}$	:	662,4	$\pm$	16,3
----------------	-----------	---	-------	-------	------

valeurs extrêmes	:	628	et	686
------------------	---	-----	----	-----

p : ***

élévation très significative

/ Pa O₂ mmHg

AIR	$\bar{X}$	:	63,7	$\pm$	11,6
-----	-----------	---	------	-------	------

valeurs extrêmes	:	39	et	82
------------------	---	----	----	----

O ₂	$\bar{X}$	:	531,6	$\pm$	51,2
----------------	-----------	---	-------	-------	------

p : ***

valeurs extrêmes	:	472	et	615
------------------	---	-----	----	-----

élévation très significative

Dans 6 cas la Pa O₂ est inférieure à 550 mmHg, ce qui témoigne de l'existence d'un discret shunt anatomique

/ PA a O₂ mmHg

AIR $\bar{X}$: 21,1 $\pm$ 11,4
valeurs extrêmes : 1 et 42

O₂ $\bar{X}$: 100,8 $\pm$ 40,8
valeurs extrêmes : 51 et 176

p : ***

élévation très significative

/ Sa O₂ pour cent

AIR $\bar{X}$: 83,9 $\pm$ 8,8
valeurs extrêmes : 60 et 94,5

O₂ $\bar{X}$: 100

p : ***

élévation très significative

/ H⁺ nano M/l

AIR $\bar{X}$: 41,8 $\pm$ 5,8
valeurs extrêmes : 33,5 et 5,59

O₂ $\bar{X}$: 44,7 $\pm$ 7,4
valeurs extrêmes : 36,3 et 61,7

p : **

élévation significative

/ CO₂ total plasmatique mEq

AIR	$\bar{X}$	:	29,65	$\pm$	4,99
valeurs extrêmes		:	24,1	et	43,8
O ₂	$\bar{X}$	:	30,5	$\pm$	5,1
valeurs extrêmes		:	23,5	et	44,2
p : *					

élévation significative

/ Pa CO₂ mmHg

AIR	$\bar{X}$	:	49,4	$\pm$	11,4
valeurs extrêmes		:	37	et	79
O ₂	$\bar{X}$	:	54,2	$\pm$	15,4
valeurs extrêmes		:	34	et	86
p : **					

élévation significative

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AU TOTAL

Sous F I O₂ = 1 on note une élévation nette de la pression partielle de l'oxygène alvéolaire et sanguin, accompagnée d'une aggravation modérée de l'acidose hypercapnique.

C) Données Hémodynamiques

1) Hémodynamique métabolique

/ FC / mn

AIR $\bar{X}$: 83,8 $\pm$ 15,4

O₂ $\bar{X}$: 81,6 $\pm$ 13,4

p : NS

diminution non significative

/ Q 1 / mn

AIR $\bar{X}$: 4,98 $\pm$ 1,31

O₂ $\bar{X}$: 5,14 $\pm$ 1,51

p : NS

élévation non significative

/ I C 1/ mn / m2

AIR $\bar{X}$: 2,97 $\pm$ 0,82

O₂ $\bar{X}$: 3,05 $\pm$ 0,83

p : NS

élévation non significative

/ V S ml

AIR $\bar{X}$: 62,4 $\pm$ 21

O₂ $\bar{X}$: 62,5 $\pm$ 21

p : NS

variation non significative

/ I S Ml/M²

AIR	$\bar{X}$	:	37,1	$\pm$	12,1
O ₂	$\bar{X}$	:	37,9	$\pm$	11,8
p : NS					

variation non significative

/ SaO₂ pour cent

AIR	$\bar{X}$	:	83,9	$\pm$	8,8
O ₂	$\bar{X}$	:	100	$\pm$	0
p : ***					

élévation très significative

/ Sv O₂ pour cent

AIR	$\bar{X}$	:	59,28	$\pm$	7,06
O ₂	$\bar{X}$	:	76,5	$\pm$	5,6
p : ***					

élévation très significative

/ Ca O₂ vol pour cent

AIR	$\bar{X}$	:	16,84	$\pm$	2,4
O ₂	$\bar{X}$	:	21,7	$\pm$	2,7
p : ***					

élévation très significative

/ $\bar{C} \bar{v} O_2$ vol pour cent

AIR	$\bar{X}$	:	11,85	$\pm$	1,9
O_2	$\bar{X}$	:	16,89	$\pm$	2,5
p : ***					

élévation très significative

/ $a \bar{v} O_2$ vol pour cent

AIR	$\bar{X}$	:	4,95	$\pm$	1,1
O_2	$\bar{X}$	:	4,82	$\pm$	1,2
p : NS					

pas de modification significative

/ $a \bar{v} O_2 / Ca O_2$ pour cent

AIR	$\bar{X}$	:	29,3	$\pm$	5,65
O_2	$\bar{X}$	:	22,3	$\pm$	4,86
p : ***					

diminution très significative

/ $Q a O_2$ ml/min

AIR	$\bar{X}$	:	494	$\pm$	131
O_2	$\bar{X}$	:	658	$\pm$	191
p : ***					

augmentation très significative

/ $Q \bar{v} O_2$ ml/min

AIR $\bar{X}$: 353 $\pm$ 120

O_2 $\bar{X}$: 519 $\pm$ 180

p : ***

augmentation très significative

XXXXXXXXXX

AU TOTAL :

. L'augmentation de la quantité d'oxygène disponible ($Q a O_2$) est liée à l'accroissement du contenu sanguin en oxygène.

Les paramètres du débit cardiaque ne sont pas modifiés de façon significative.

Il faut remarquer qu'une très importante partie de l'oxygène inhalé retourne au poumon sans être utilisé, ce qui peut expliquer la diminution significative du taux d'extraction d'oxygène.

2) Hémodynamique du coeur droit et de la circulation pulmonaire

/ PAPS mmHg

AIR	$\bar{X}$	:	41,17	$\pm$	19,5	
O ₂	$\bar{X}$	:	38,28	$\pm$	16,1	(théor, 23,4 $\pm$ 3,5)
	p	:	*		p	: ***

la diminution air/oxygène est significative.

PAPd mmHg

AIR	$\bar{X}$	:	15,4	$\pm$	10	
O ₂	$\bar{X}$	:	14,8	$\pm$	8,9	(théor 9,4 $\pm$ 1,8)
	p	:	NS		p	: **

la diminution air/ oxygène n'est pas significative

PAP mmHg

AIR	$\bar{X}$	:	26,25	$\pm$	14,1	
O ₂	$\bar{X}$	:	24	$\pm$	10,5	(théor 15,3 $\pm$ 2,6)
	p	:	NS		p	: ***

la diminution air/oxygène n'est pas significative

PCP mmHg

AIR	$\bar{X}$	:	4,58	$\pm$	3,1	
O ₂	$\bar{X}$	:	4,69	$\pm$	3,3	(théor 9,2 $\pm$ 1,8)
	p	:	NS		p	: ***

aucune variation significative

PAP - PCP mmHg

AIR	$\bar{X}$	:	21,7	$\pm$	14,6	
O ₂	$\bar{X}$	:	19,3	$\pm$	9,8	(théor 5,6 $\pm$ 1,5)
	p	:	NS		p	: ***

la diminution air/oxygène n'est pas significative

RPT dynes /s/cm⁻⁵

AIR	$\bar{X}$	:	456,2	$\pm$	280	
O ₂	$\bar{X}$	:	419,9	$\pm$	253	(théor 247 $\pm$ 34)
	p	:	NS		p	: ***

la diminution air/oxygène n'est pas significative

RAP dynes/s/cm⁻⁵

AIR	$\bar{X}$	:	376,8	$\pm$	284	
O ₂	$\bar{X}$	:	338,7	$\pm$	216	(théor 93 $\pm$ 26)
	p	:	NS		p	: ***

la diminution air/oxygène n'est pas significative.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AU TOTAL :

L'inhalation d'oxygène pur exerce peu d'influence sur les pressions de la circulation pulmonaire bien que celles-ci soient étroitement corrélées avec la désaturation oxyhémoglobinée à l'état basal. Ce phénomène semble lié aux nombreux éléments responsables de l' HTAP dont le déterminisme apparemment complexe ne peut être expliqué par la seule désaturation oxyhémoglobinée.

Le problème sera étudié page (corrélations entre l'évolution PAP et les gaz du sang).

Comparées aux valeurs théoriques sous oxygène ces pressions droites demeurent anormalement élevées.

La pression capillaire pulmonaire est normale.

Les résistances pulmonaires vasculaires sont élevées de façon pathologique.

3) Hémodynamique du coeur gauche et de l'aorte.

Dans le protocole utilisé, il n'a été possible de recueillir les pressions aortiques (PAoS, PAod, PAo) que dans 9 cas.

Les comparaisons concernant l'aorte ne sont effectuées que pour ces 9 malades.

/ PAoS mmHg

n = 9

AIR	$\bar{X}$	:	123,3	$\pm$	23,5
O ₂	$\bar{X}$	:	130,6	$\pm$	22,7
	p	:	NS		

élévation non significative

/ PAod mmHg

n = 9

AIR	$\bar{X}$	:	64,4	$\pm$	11,8
O ₂	$\bar{X}$	:	71,1	$\pm$	12,9
	p	:	NS		

élévation non significative

/ PAo mmHg

n = 9

AIR	$\bar{X}$	:	90,2	$\pm$	10,7
O ₂	$\bar{X}$	:	96,3	$\pm$	13,1 (théor 102,7 $\pm$ 5,4)
	p	:	*		p : *

élévation significative

/ Résistances artérielles systémiques dynes/s/cm⁻⁵

n = 9

AIR	$\bar{X}$	:	1688	$\pm$	441	
O ₂	$\bar{X}$	:	1781	$\pm$	363	(théor 1802 $\pm$ 403)
	p	:	NS			p : NS

augmentation non significative

/ PV G S mmHg

n = 18

AIR	$\bar{X}$	:	119,5	$\pm$	15,4	
O ₂	$\bar{X}$	:	133,1	$\pm$	22,7	
	p	:	***			

augmentation significative

/ PVGtd mmHg

AIR	$\bar{X}$	:	5,6	$\pm$	4,4	
O ₂	$\bar{X}$	:	7,5	$\pm$	5,4	
	p	:	***			

augmentation significative

/ Travail systolique VG/gm/m²

état basal	$\bar{X}$	:	59	$\pm$	22	
oxygène	$\bar{X}$	:	67	$\pm$	29	
	p	:	*			

élévation significative

/ dp/dt mmHg/s

AIR $\bar{X} : 1557,7 \pm 352,7$

O₂ $\bar{X} : 1495,5 \pm 344,3$

p : NS

diminution non significative

/ PI mmHg

AIR $\bar{X} : 55,8 \pm 5,9$

O₂ $\bar{X} : 56,8 \pm 10,6$

p : NS

aucune variation significative

/ dp/dt
PI cycles s⁻¹

AIR $\bar{X} : 28,4 \pm 8,4$

O₂ $\bar{X} : 26,9 \pm 8,2$

p : **

diminution significative

/ temps d'éjection aortique en p cent de valeur normale

AIR $\bar{X} : 95,3 \pm 8,9$

O₂ $\bar{X} : 93,0 \pm 5,5$

p : NS

diminution non significative

AU TOTAL :

L'inhalation d'oxygène pur élève de façon significative la pression ventriculaire gauche systolique et la $\overline{PAo}$, ce qui explique l'augmentation significative du travail systolique ventriculaire gauche.

Il faut noter sur la $\overline{PAo}$ est anormalement élevée dans 3 cas sur 18 à l'état basal, dans 4 cas sur 9 au cours de l'inhalation d'oxygène pur.

La PVGtd augmente de façon très significative tout en restant dans des valeurs normales .

Parmi les indices de la contractibilité ventriculaire gauche, seul le rapport

$$\frac{dp/dt}{PI}$$

est abaissé de façon sensible.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Courbe de fonction ventriculaire gauche Air -O²


Travail systolique V G / P V G td

ETAT BASAL r = 0,012

OXYGENE r = 0,026

ETAT BASAL ○
 OXYGENE △





Courbe de fonction ventriculaire gauche
valeurs moyennes

O : état basal (n = 18)


Δ : sous inhalation d'oxygène pur (n = 18)

PVGtd

AIR	$\bar{X}$	:	5,6	$\pm$	2,10	(SE)
O ₂	$\bar{X}$	:	7,5	$\pm$	2,32	-

W systVG

AIR	$\bar{X}$	:	59	$\pm$	4,69	(SE)
O ₂	$\bar{X}$	:	67	$\pm$	5,39	-



C) CORRELATIONS sous O_2

1) Pressions droites et gaz du sang n = 18

	$\overline{PCP}$	H^{+*}	$P_a \text{ CO}_2$	$100-Sa \text{ O}_2$ (=0)
$\overline{XPAP}$	0,355	0,554 *	0,616 **	-
$\overline{PCP}$		0,182	- 0,056	-
H^+			*** 0,851	-
$P_a \text{ CO}_2$				-

Les résultats sont superposables à ceux qui ont été recueillis à l'état basal.

Les pressions capillaires pulmonaires et artérielles pulmonaires moyennes sont indépendantes.

L'hypoxie corrigée , la pression artérielle pulmonaire moyenne reste tributaire de l'acidose hypercapnique.

La désaturation en oxygène étant nulle, il n'a pas été possible de calculer les corrélations avec ce paramètre.

2) Pressions gauches et gaz du sang n = 18

	PVGtd	H ⁺	Pa CO ₂	100-Sa O ₂
PV GS	0,369	- 0,055	- 0,258	-
PVGtd		0,030	- 0,152	-
H ⁺			*** 0,851	-
Pa CO ₂				-

Comme à l'état basal, les ions H⁺ et la Pa CO₂ n'exercent aucune influence sur les paramètres hémodynamiques du coeur gauche.

3) Pressions gauches et pressions droites n = 18

	PVG td	P C P	P A P
PV G S	0,369	0,290	- 0,154
PV Gtd		^{**} 0,631	0,032
PCP			0,355

Comme à l'état basal :

- les pressions gauches et droites évoluent chacune pour leur propre compte.
- la pression capillaire pulmonaire est corrélée avec PVGtd.

4) Indices de contractilité ventriculaire gauche en fonction

- des gaz du sang
- des pressions gauches
- des pressions droites

	$\frac{dp/dt}{PI}$	$PaCO_2$	H^+	$100-SaO_2$ =0	PCP	PAP	PVGS	PVGtd
dp/dt	<u>0,694</u> **	0,224	0,236	-	- 0,099	0,158	<u>0,488</u> *	- 0,410
$\frac{dp/dt}{PI}$		0,303	0,304	-	- 0,231	0,092	0,003	<u>- 0,576</u> *
$PaCO_2$			<u>0,851</u> ***	-	- 0,056	<u>0,616</u> **	-0,258	- 0,152
H^+				-	0,182	<u>0,554</u> *	-0,055	0,030
$100-SaO_2$					-	-	-	-
PCP						0,355	0,290	<u>0,631</u> **
PAP							-0,154	0,032
PVGS								0,369

Comme à l'état basal une seule relation est retenue :

le rapport $\frac{dp/dt}{PI}$ est une fonction de PVGtd, ce qui tend à prouver que dans le calcul de ce rapport, l'indice de contractilité reste tributaire de la PVGtd.

D) CORRELATIONS DIFFERENTIELLES

Il s'agit de corrélations calculées sur les différences entre la valeur recueillie en air ambiant et celle observée chez le malade inhalant de l'oxygène pur.

Alors que les tests de comparaison en valeur absolue ne montrent pas de différence significative, l'étude des gradients (Δ) peut, dans certains cas, mettre en évidence une variation significative, du fait d'un plus haut pouvoir discriminant.

$$1 - \overline{\text{PAP}} \quad \Delta \quad 100 - \text{SaO}_2$$

Δ fréquence cardiaque (FC) fig

La variation de $\overline{\text{PAP}}$ est corrélée avec l'importance de la désaturation initiale et la variation de la fréquence cardiaque (la variation de H^+ et de la PaCO_2 n'intervenant pas). Le diagramme montre que la relation entre la diminution de PAP et la diminution de FC est d'autant plus sensible que la désaturation initiale était plus marquée.

$$2 - \Delta \frac{dp/dt}{PI} \quad \text{et} \quad \begin{array}{l} \Delta \text{ gaz du sang} \\ \Delta \text{ fréquence cardiaque} \end{array}$$

Les variations de l'indice de contractilité ventriculaire gauche sont corrélées avec les variations de la fréquence cardiaque (FC)

A une diminution de la fréquence cardiaque correspond une diminution de l'indice de contractilité.

En revanche, il n'y a pas de différence entre la variation de l'indice de contractilité et l'importance de la désaturation oxyhémoglobinée initiale.

On peut donc penser que la contractilité estimée à travers cet indice est relativement indépendante de l'hypoxie chronique.

CORRELATIONS DIFFERENTIELLES

$$\begin{array}{lcl} 1) & \Delta & \overline{\text{PAP}} \\ & & 100 - \text{SaO}_2 \\ & \Delta & \text{fréquence cardiaque} \\ & & (\Delta \text{ FC }) \end{array}$$

Diagramme de la page suivante :

légende

- Variations de la PAP
entre la valeur obtenue en air ambiant et celle mesurée
sous inhalation d'oxygène pur

en fonction de la

- DESATURATION OXYHEMOGLOBINEE

$$r = 0,57 \quad *$$


Δ $\overline{\text{PAP}}$ mmHg

Diagramme de la page suivante :

légende

- Variations de la PAP
entre la valeur obtenue en air ambiant et celle mesurée
sous inhalation d'oxygène pur

en fonction des

- VARIATIONS de la FC

$$r = 0,800 \quad ***$$




Diagramme de la page suivante :

légende

- Variations de la PAP

entre la valeur obtenue en air ambiant et celle mesurée
sous inhalation d'oxygène pur

en fonction des

- VARIATIONS de la FC air/oxygène

et de la

- DESATURATION INITIALE

$$r = 0,820 \quad ***$$

$$SE = 3,6$$


Les trois paramètres sont liés par la relation :

$$\Delta \text{ PAP} = 0,9271 - 0,1273 (100 - \text{SaO}_2) + 0,5227 (\Delta \text{ FC})$$

L'inhalation d'oxygène pur engendre une baisse de la $\overline{\text{PAP}}$
dans la mesure où apparaît une diminution de la fréquence car-
diaque.

L'abaissement de la $\overline{\text{PAP}}$ est plus sensible lorsque la dé-
saturation oxyhémoglobinée est initialement plus marquée.

Δ PAP mmHg



Si l'oxygène ne fait que restaurer la saturation oxyhémoglobinée, la diminution de la $\overline{\text{PAP}}$ est modeste, voire négligeable.

En revanche si l'oxygène engendre un ralentissement du rythme cardiaque, l'abaissement de la PAP devient plus substantiel.

Chez des malades peu désaturés en oxygène, l'abaissement de la $\overline{\text{PAP}}$ est pratiquement uniquement lié à la diminution de la fréquence cardiaque.

CORRELATIONS DIFFERENTIELLES

2) indice de la contractilité VG

$$\left(\frac{\Delta \text{ dp/dt }}{\text{PI}} \right)$$

et Δ fréquence cardiaque (FC)

et Δ $100 - \text{SaO}_2$

Diagramme de la page suivante :

légende

- VARIATIONS de l'indice de contractilité VG $\Delta \frac{dp/dt}{PI}$

entre la valeur déterminée en air ambiant et celle mesurée
sous inhalation d'oxygène pur .

en fonction

- des VARIATIONS de la fréquence cardiaque air/oxygène
(Δ FC)

$$r = 0,708^{***}$$

5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6

$\Delta \frac{dp/dt}{PI}$

16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

ΔFC




Diagramme de la page suivante :

légende

- VARIATIONS de l'indice de contractilité VG $\left(\frac{\Delta dp/dt}{PI} \right)$

entre la valeur déterminée en air ambiant et celle mesurée
sous inhalation d'oxygène pur

en fonction

- des VARIATIONS de la fréquence cardiaque air/oxygène
(ΔFC)

et de la

- DESATURATION OXYHEMOGLOBINEE


$$r = 0,711 \quad ***$$

$$SE = 1,65$$

Les trois paramètres sont liés par la relation :

$$\Delta \frac{dp/dt}{PI} = 1,3003 + 0,0201 (100 - SaO_2) + 0,2156 (\Delta FC)$$

$\Delta \frac{dp/dt}{PI}$ cycles - sec



5) COMPARAISONS ENTRE

A) - 8 SUJETS comportant un risque vasculaire (groupe A)

-10 SUJETS sans facteur de risque vasculaire (groupe B)
connu

(cf caractéristiques du groupe p

a) Conditions gazométriques et équilibre acidobasiqueSa O₂ pour cent

Groupe A	$\bar{X}$	:	100
Groupe B	$\bar{X}$	:	100
	p	:	NS

Pa CO₂ mmHg

Groupe A	$\bar{X}$	:	47,9	$\pm$	11,6
Groupe B	$\bar{X}$	:	59,3	$\pm$	16,8
	p	:	NS		

H⁺ nMl/l

Groupe A	$\bar{X}$	:	42,0	$\pm$	4,6
Groupe B	$\bar{X}$	:	46,9	$\pm$	8,6
	p	:	NS		

b) Conditions pressionnelles droitesPAP mmHg

Groupe A	$\bar{X}$	:	17,88	$\pm$	4,71
Groupe B	$\bar{X}$	:	28,90	$\pm$	11,45
	p	:	**		

c) Conditions pressionnelles gauchesPCP mmHg

Groupe A	$\bar{X}$	:	4,06	$\pm$	2,87
Groupe B	$\bar{X}$	:	5,2	$\pm$	3,68
	p	:	NS		

PV GS mmHg

Groupe A	$\bar{X}$	:	145,5	$\pm$	24,6
Groupe B	$\bar{X}$	:	123,25	$\pm$	16,1
	p	:	*		

Travail systolique ventriculaire gauche gm/m²

Groupe A	$\bar{X}$	:	83,88	$\pm$	28,29
Groupe B	$\bar{X}$	:	53,50	$\pm$	21,65
	p	:	**		

d) Indice de compliancePV Gtd mmHg

Groupe A	$\bar{X}$	:	7,11	$\pm$	3,73
Groupe B	$\bar{X}$	:	7,88	$\pm$	6,58
	p	:	NS		

e) post chargePAo

Groupe A	$\bar{X}$	:	102	$\pm$	11
Groupe B	$\bar{X}$	:	92	$\pm$	14
	p	:	NS		

Résistances artérielles systémiques dynes/ 5 /sec

Groupe A	$\bar{X}$	:	1408	$\pm$	526
Groupe B	$\bar{X}$	:	1192	$\pm$	530
	p	:	NS		

f) indices de contractilité VGdp/dt mmHg /sec

Groupe A	$\bar{X}$	:	1552	$\pm$	343
Groupe B	$\bar{X}$	:	1450	$\pm$	357
	p	:	NS		

 $\frac{dp/dt}{PI}$ cycles/ sec

Groupe A	$\bar{X}$	:	27,5	$\pm$	10,0
Groupe B	$\bar{X}$	:	23,8	$\pm$	8,8
	p	:	NS		

AU TOTAL

L'épreuve d'effort apporte peu de renseignements nouveaux par rapport à l'état basal sur les 8 sujets présentant un facteur de risque cardiovasculaire.

Les pressions gauches sont plus élevées que dans le groupe sans facteur de risque vasculaire, de façon non significative pour $\overline{\text{PAo}}$ significative pour PVGS.

Le travail systolique ventriculaire gauche est significativement plus élevé que dans l'autre groupe.

COMPARAISON ENTRE

(sous inhalation d'oxygène pur)

B - 10 malades ayant des antécédents d' IVD (Groupe I)

- 8 malades sans antécédents d' IVD (Groupe II)

(caractéristiques du groupe I page 19)

conditions gazométriques et équilibre acidobasiqueSa O₂ pour centGroupe I $\bar{X}$: 100Groupe II $\bar{X}$: 100

p : NS

Pa CO₂ mmHgGroupe I $\bar{X}$: 58,8 $\pm$ 16,8Groupe II $\bar{X}$: 48,5 $\pm$ 12,1

p : *

H⁺ nM/lGroupe I $\bar{X}$: 43,27 $\pm$ 4,59Groupe II $\bar{X}$: 42,03 $\pm$ 6,26

p : NS

b) Conditions pressionnelles droitesPAP mmHgGroupe I $\bar{X}$: 29,90 $\pm$ 10,25Groupe II $\bar{X}$: 16,63 $\pm$ 4,58

p : ***

c) Conditions pressionnelles gauchesPCP mmHg

Groupe	I	$\bar{X}$	:	6,10	$\pm$	3,67
Groupe	II	$\bar{X}$	:	2,94	$\pm$	1,68
		p	:	*		

PV GS mmHg

Groupe	I	$\bar{X}$	:	130,5	$\pm$	25,9
Groupe	II	$\bar{X}$	:	136,4	$\pm$	19,1
		p	:	NS		

PAo

6 cas	Groupe	I	$\bar{X}$	:	96,2	$\pm$	15,0
3 cas	Groupe	II	$\bar{X}$	:	96,3	$\pm$	10,5
		p	:	NS			

Travail systolique ventriculaire gauche Gm/m2

Groupe	I	$\bar{X}$	:	65,60	$\pm$	28,74
Groupe	II	$\bar{X}$	:	68,75	$\pm$	30,34
		p	:	NS		

PVGtd mmHg

Groupe	I	$\bar{X}$	:	9,80	$\pm$	6,04
Groupe	II	$\bar{X}$	:	4,71	$\pm$	2,57
		p	:	*		

f) Indices de contractilité VGdp/dt mmHg / sec

Groupe	I	$\bar{X}$	:	1526	$\pm$	326
Groupe	II	$\bar{X}$	:	1457	$\pm$	385
		p	:	NS		

dp/dt
PI cycles - sec⁻¹

Groupe	I	$\bar{X}$	:	25,6	$\pm$	6,2
Groupe	II	$\bar{X}$	:	28,7	$\pm$	10,0
		p	:	NS		

EN	CONCLUSION
----	------------

Sous l'effet de l'inhalation d'oxygène la fonction ventriculaire gauche des 10 malades ayant des antécédents d'IVD comparée à celle des 8 malades indemnes d'antécédents d'IVD présente une diminution de la compliance ventriculaire gauche, (attestée par une élévation significative de la pression ventriculaire gauche télédiastolique et de la pression capillaire pulmonaire moyenne, sans que le travail systolique présente de variation significative).

Courbe de fonction ventriculaire gauche

PVGtd mmHg

WsystVG gm/m2

AIR et OXYGENE


1) 10 malades ayant des antécédents d' IVD

PVGtd	air	=	6,85	±	2,32	(écart standard m)			
PVGtd	O ₂	=	9,80	±	2,46	"	"	"	
WsystVG		=	56,4	±	5,5	"	"	"	
Wsyst VG	O ₂	=	65,6	±	6,8	"	"	"	

2) 8 malades sans antécédents d' IVD

PVGtd	air	=	4,1	±	1,52	"	"	"	
PVGtd	O ₂	=	4,71	±	1,60	"	"	"	
WsystVG	air	=	61,5	±	4,71	"	"	"	
WsystVG	O ₂	=	68,75	±	5,51	"	"	"	

W systolique externe VG gm/m^2



PVGtd mmHg

	AIR	OXYGENE		age moyen
avec antécédents d'IVD	⊙	⊗	n = 10	63 ans
sans " "	×	⊗	n = 8	66 ans

La pente de fonction VG recueillie chez 10 patients ayant des antécédents d' IVD est moins importante que chez les malades sans antécédents d' IVD.

Les malades avec antécédents d' IVD ont un déficit de la fonction ventriculaire gauche potentiel.

TABLEAU COMPARATIF des valeurs moyennes

malades avec antécédents d' IVD (Groupe I)

- sans antécédents d' IVD (Groupe II)

à l'état basal et sous inhalation d'oxygène pur.

		Groupe I		Groupe II
<u>dp/dt</u>	AIR :	26,7	NS	30,6
<u>PI</u>		NS		NS
	O ₂ :	25,6	NS	28,7

Wsyst VG

			NS	
AIR :	56,4			61,5
	NS			NS
O ₂ :	65,6		NS	68,7

PVGtd

AIR :	6,85		NS	4,10
	NS			NS
O ₂ :	9,80			4,71
			*	

Pa CO₂

			*	
AIR :	53,4			44,5
	NS			NS
O ₂ :	58,8			48,5
			*	

<u>H⁺</u>		<u>Groupe I</u>		<u>Groupe II</u>
	AIR :	43,8	_____*	39,2
		NS		NS
	O ₂ :	43,3	_____NS	42,0

<u>PAP</u>				
	AIR :	33,7	_____**	17,0
		NS		NS
	O ₂ :	29,9	_____***	16,6

<u>PCP</u>				
	AIR :	4,85	_____NS	4,25
		NS		NS
	O ₂ :	6,10	_____*	2,94

<u>PVGS</u>				
	AIR :	115,5	_____NS	127,2
		*		NS
	O ₂ :	130,5	_____NS	136,4

<u>PA_o</u>				
	AIR	88,9	_____NS	91,6
		*		NS
	O ₂	96,2	_____NS	96,3

B I O M E T R I E

	DATE	AGE	TAILLE m	POIDS kg	SURFACE m ²
BOUD ...	12. 3. 73	74	1,73	78	1,93
BOUR ...	23. 1. 74	67	1,64	58	1,63
DUB ...	5. 6. 73	57	1,60	55,5	1,57
DUPO ...	15. 3. 73	63	1,68	83	1,94
DUPR ...	23. 3. 74	65	1,54	50	1,47
GOL ...	24.10. 73	75	1,63	62	1,67
GUIL ...	16. 1. 74	69	1,70	69,5	1,81
LEO ...	17.12. 74	61	1,70	66	1,77
MER ...	25. 1. 73	68	1,57	41	1,37
MIC ...	23.10. 73	66	1,55	51	1,48
MOR ...	22. 6. 73	66	1,58	57	1,58
PEY ...	16. 5. 73	71	1,63	74,5	1,86
PRA ...	31.10. 73	62	1,63	53,5	1,57
RES ...	24. 7. 75	53	1,63	45	1,46
ROC ...	2.10. 75	63	1,65	85	1,93
SOR ...	15. 7. 74	64	1,76	71	1,87
VER ...	18. 5. 73	55	1,70	59	1,69
VUE ...	3. 1. 74	64	1,63	70	1,75
		64,6	1,64	62,7	1,69
		+ 5,8	+ 0,06	+ 12,7	+ 0,18

SPIROMETRIE

	C V l	% N	V E M S l	% N	V max l/min	% N	V R l	% N	C T l	% N	VEMS/CV théor. %	VEMS/VR %
BOUD...	2 975	85	0 825	35	24 240	34 5	5 580	339 2	8 560	166 5	27 7	0 147
BOUR...	2 705	82	1 535	68	40 385	60	1 910	124	4 530	94	56 6	0 804
DUB ...	1 840	47	0 685	24	26 710	32	3 060	201	5 080	94	37 2	0 224
DUPO...	1 975	44	0 780	25	28 250	30	2 900		4 875		39 4	0 269
DUPR...	2 795	94	0 815	40	25 800	42	1 850	132	4 645	113	29 2	0 441
GOL ...	1 950	61	0 535	25	21 485	34	3 720	249	5 720	123	27 4	0 144
GUIL...	2 953	85	0 727	31	20 115	28	4 700	289	7 653	133	24 6	0 155
LEO ...	3 560	77	1 700	53	44 690	47	2 800	146	5 700	88	47 7	0 607
MER ...	1 305	43	0 545	26	10 775	17	1 670	115	2 950	65	41 7	0 326
MIC ...	2 830	94	1 360	66	47 160	76	4 050	286	6 710	152	48	0 336
MOR ...	2 268	73	1 124	53	37 185	59	-	-	-	-	49 5	-
PEY ...	2 500	74	1 509	67	43 057	64	-	-	-	-	60 3	-
PRA ...	2 568	63	0 706	25	20 800	25	2 610	154	5 510	96	27 5	0 270
RES ...	1 570	37	0 559	18	15 600	17	3 930	260	5 530	97	35 6	0 142
ROC ...	1 947	46	0 685	24	22 873	39	3 300	189	5 400	93	35 1	0 208
SOR ...	2 105	41	0 990	28	27 905	26	2 700	127	4 660	65	46 9	0 367
VER ...	3 370	72	1 425	43	48 190	45	2 430	134	5 870	90	42	0 586
VUE ...	1 635	40	0 620	22	20 810	25	2 860	169	4 660	82	38 1	0 217

$\bar{x}$	2,38	64,3	0 951	37,4	29 224	38,9	3 129	194	5503	103,4	39,7	69,6	0,328
σ	+ 0,64	+ 19,8	+0,388	+ 16,9	+ 11 367	+ 16,7	+ 1 057	+ 72,5	+ 1 313	+ 29,2	+ 10,4	+ 1,8	+ 0,193

V E N T I L A T I O N

	V L / mn		FR / M n		Vt L		V A L / mn		E M P L		VA / V %	
	Air	0 2	Air	0 2	Air	0 2	Air	0 2	Air	0 2	Air	0 2
BOUT ...	7 485	5 985	23	28	0 33	0 21	2 970	1 705	0 196	0 152	40	28 5
BOUR ...	6 285	5 945	10	13	0 63	0 46	3 825	3 235	0 245	0 208	61	54 5
DUB ...	7 460	4 770	23	21 5	0 32	0 22	2 280	1 900	0 225	0 133	30 5	40
DUPO ...	8 745	8 080	18	17	0 49	0 48	4 030	3 410	0 261	0 274	46	42
DUPR ...	6 680	7 550	10	10	0 67	0 75	3 100	3 320	0 358	0 423	46 5	44
GOL ...	8 790	6 312	27	28	0 325	0 225	2 690	2 780	0 225	0 125	30 6	44
GUIL ...	6 210	6 680	12 5	11 5	0 496	0 580	2 990	2 940	0 257	0 325	48	44
LEO ...	11 455	10 790	23	24	0 50	0 45	4 725	4 665	0 292	0 255	41	43
MER ...	4 220	4 690	32	28	0 132	0 167	1 220	1 405	0 09	0 117	29	30
MIC ...	7 890	6 650	13	19	0 606	0 350	3 357	2 550	0 348	0 215	42 5	38 3
MOR ...	9 870	6 770	21	21	0 47	0 32	3 735	2 670	0 292	0 195	38	44
PEY ...	8 545	6 750	13	17 5	0 657	0 382	4 536	3 978	0 308	0 158	53	59
PRA ...	6 295	5 047	8	15 5	0 787	0 325	3 360	2 860	0 366	0 131	53	56
RES ...	5 469	4 589	21	17	0 26	0 269	1 928	1 273	0 168	0 193	35	27 7
ROC ...	8 104	7 390	31	29 5	0 261	0 250	3 240	2 64	0 156	0 161	40	48
SOR ...	10 940	9 375	35	27	0 310	0 345	3 335	2 795	0 215	0 241	30	30
VER ...	11 350	7 565	23	20 5	0 493	0 369	4 270	3 485	0 307	0 199	38	46
VUE ...	8 245	9 090	16 5	22	0 311	0 413	4 060	4 275	0 253	0 218	49 2	47

$\bar{X}$ 8,002 6,89 20 20,5 0,447 0,364 3,31 2,88 0,253 0,206 41,7 42,6
 $\pm$ 2,013 $\pm$ 1,69 $\pm$ 8 $\pm$ 6 $\pm$ 0,176 $\pm$ 0,145 $\pm$ 0,91 $\pm$ 0,93 $\pm$ 0,073 $\pm$ 0,077 $\pm$ 9,1 $\pm$ 9,0
 $\pm$ ** $\pm$ NS $\pm$ * $\pm$ NS

GAZOMETRIE EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE REPOS / EFFORT

	PAO ₂ mmHg		PaO ₂ mmHg		PaO ₂ mmHg		SaO ₂ %		SVO ₂ %		PH		H ⁺ nmo/ml/l		CO ₂ tot pl mEq/l		PaCO ₂ mmHg	
	rep	eff	rep	eff	rep	eff	rep	eff	rep	eff	rep	eff	rep	eff	rep	eff	rep	eff
BOUD...	77	86	65	64	12	22	82	81	62	51,5	7,380	7,34	41,7	45,7	32,5	30,1	54	54,4
BOUR...	99	112	78	80	21	32	90,5	93	64	54,5	7,405	7,30	39,4	50,1	24,20	17,0	38	33,6
DUB ...	68	72	556	48	12	24	77,5	69,5	61,5	44,5	7,245	7,13	56,9	74,1	29,55	27,23	66	77
DUP ...	88	96	74	77	14	19	90,5	92,5	67	55,5	7,415	7,36	38,4	43,6	28,57	26,2	44	45,3
MOR ...	96	93	64	66	32	27	88	89	66	53,5	7,385	7,30	41,2	50,1	27,90	26,81	46	52,7
PEY ...	85	98	73	64	12	34	92	90	63	47	7,400	7,34	39,8	45,2	24,60	23,53	40	42
PRA ...	97	100	58	53	39	47	85,5	78	59	46,5	7,400	7,26	39,8	54,9	27,60	23,3	44	50
ROC ...	82	86	62	53	20	33	82,5	79	55,5	45,5	7,335	7,31	46,2	48,9	27,80	26,80	51	54
VER ...	91	88	56	52	35	36	83,5	79	66,5	51	7,365	7,28	43,1	52,5	28,64	26,30	49	54
VUE ...	90	89	77	78	13	11	92,5	93	65,5	53	7,385	7,37	41,2	42,2	27,70	24,90	46	42

$\bar{x}$ 87,3 92,2 66,3 63,5 21,5 28,5 86,45 84,4063 50,5
 σ ± 9,7 ±10,6 ± 8,6 ±11,8 ±10,5 ±10,1 ± 5,03 ± 8,12 ±3,7 ± 4
 σ

σ

ECHANGES GAZEUX PULMONAIRES (CO₂ - CO) C A P N I G R A M M E

P a C O ₂ mmHg	PAECO ₂ mmHg	PECO ₂ mmHg	P - CO ₂ P A E CO ₂ mmHg	P A E CO ₂ P a CO ₂	P E C O ₂ P A E CO ₂	P E CO ₂ P a CO ₂ (VA/V %)	D CO	D CO CT
BOUD...	44	44	0,	1,00	0,480	48,5	28,07	3,27
BOUR...	39	33,7	5,3	0,86	0,685	59,0	12,99	2,87
DUB ...	61,5	36,2	25,3	0,59	0,550	32,5	19,44	3,82
DUPO...	36,3	26,2	10,1	0,72	0,770	55,4	20,62	4,23
DUPR...	35	28,4	6,6	0,82	0,616	50,3	11,95	2,41
GOL ...	48,8	35,5	11,3	0,77	0,424	32,6	14,58	2,55
GUIL...	43,2	35	8,2	0,81	0,624	50,5	9,75	1,44
LEO ...	43,3	26,7	16,6	0,62	0,622	38,4	14,63	2,50
MER ...	73,8	46	27,8	0,62	0,498	31	9,06	3,07
MIC ...	39,9	25,2	14,07	0,63	0,677	42,7	3,30	0,49
MOR ...	44,7	31	13,7	0,69	0,561	38,9		
PEY ...	45,9	38,4	7,5	0,99	0,539	45,1		
PRA ...	43	34	9	0,79	0,686	54,1	7,24	1,31
RES ...	66,2	53,5	12,7	0,81	0,462	37,2	7,26	1,31
ROC ...	54,2	43,3	10,9	0,80	0,468	37,4	13,96	2,58
SOR ...	45	31,3	13,7	0,69	0,528	36,3	10,7	2,30
VER ...	47,7	36	11,7	0,76	0,511	38,5	14,6	2,50
VUE ...	43,2	36	7,2	0,83	0,633	52,4	16,03	3,44
$\bar{x}$	47,4	35,7	11,8	0,77	0,574	43,4	13,39	2,51
σ	$\pm 10,3$	$\pm 7,5$	$\pm 6,6$	$\pm 0,12$	$\pm 0,095$	$\pm 8,7$	$\pm 5,97$	$\pm 0,99$

HEMODYNAMIQUE METABOLIQUE AIR / O₂ (suite)

	CapO ₂ v p cent		S $\bar{v}$ O ₂ p cent		C a O ₂ vol p cent		C $\bar{v}$ O ₂ vol p cent		
	Air	O ₂	Air	O ₂	Air	O ₂	Air	O ₂	
BOUD ...	21,88	82	62	81	17,70	23,08	130	17,54	131
BOUR ...	15,78	90,5	64	71	14,5	15,21	108	12,06	122
DUBO ...	22,56	77,5	61,5	82,5	17,26	24,56	142	20,64	151
DUPO ...	19,01	90,5	67	77	16,97	22,37	132	16,31	130
DUPR ...	18,21	94,5	63,5	71,5	17,02	19,22	113	14,10	124
GOL ...	18,90	91	61,5	76,5	16,97	22,44	132	17,61	154
GUIL ...	18,81	81,5	54	66	15,08	19,82	132	14,05	141
LEO ...	23,55	87,5	57,5	65	20,37	24,76	122	16,50	124
MER ...	17,97	60	48	84,5	10,60	18,82	178	15,15	179
MIC ...	19,06	84	57,5	74,5	15,77	19,01	121	14,50	135
MOR ...	22,09	88	66	79,5	19,22	24,18	126	18,35	128
PEY ...	18,02	92	63	81	16,36	18,47	113	13,96	125
PRA ...	24,46	85,5	59	80,5	20,67	25,24	122	21,13	148
RES ...	21,09	67,5	39,5	77,5	14,04	21,99	157	17,43	212
ROC ...	21,27	82,5	55,5	74,5	17,30	24,39	141	19,13	164
SOR ...	21,56	80,5	55,5	73,5	17,12	22,52	132	19,40	165
VER ...	21,64	83,5	66,5	83,5	17,83	22,70	127	18,77	132
VUE ...	19,94	92,5	65,5	77,5	18,82	22,02	117	17,42	135
$\bar{x}$	20,32	83,9	59,3	76,5	16,8	21,7	117	16,9	
σ	+ 2,26	+ 8,8	+ 7,1	+ 5,6	+ 2,4	+ 2,7	+ 1,9	+ 2,5	
P	L****	L****	L****	L****	L****	L****	L****	L****	

HEMODYNAMIQUE AIR / O₂ (suite)

	Δ avO ₂ vol p cent		$\frac{\Delta \text{avO}_2}{\text{QaO}_2}$ p cent		QaO ₂ ml / mn		QvO ₂ ml / mn	
	Air	O ₂	Air	O ₂	Air	O ₂	Air	O ₂
BOUD...	4,33	5,54	24	24	532,8	542,4	402,5	412,2
BOUR...	4,14	3,15	29	21	441,2	628,2	311,2	498,1
DUBO...	3,58	3,92	21	16	662,8	805,6	525,4	677,0
DUPO...	4,44	6,06	26	27	571,9	552,6	422,3	402,9
DUPR...	5,65	5,12	33	27	338,7	422,9	226,3	310,2
GOL ...	5,54	4,83	33	22	439,6	666,5	296,1	523,1
GUIL...	5,10	5,82	34	29	339,3	391,5	224,6	276,8
LEO ...	7,01	8,26	34	33	411,5	425,9	269,9	283,8
MER ...	2,12	3,67	20	20	495,1	508,2	396,6	409,1
MIC ...	4,99	4,51	32	24	474,7	635,0	324,5	484,3
MOR ...	4,84	5,83	25	24	609,3	638,4	455,9	484,5
PEY ...	5,20	4,51	32	24	466,3	607,7	318,1	459,3
PRA ...	6,42	4,11	31	16	469,3	893,5	323,5	748,1
RES ...	5,81	4,56	41	21	337,0	672,9	197,3	533,4
ROC ...	5,67	5,26	33	22	401,4	609,8	269,9	478,3
SOR ...	5,33	3,12	31	14	470,8	1058,5	324,3	911,8
VER ...	3,64	3,93	20	17	871,9	1028,4	693,9	850,3
VUE ...	5,36	4,60	28	21	551,-	756,3	376,8	597,6

X 4,9 4,8 29,3 22,3 494 658 353 519

± 1,1 ± 1,2 ± 5,7 ± 4,9 ± 131 ± 191 ± 120 ± 180

p NS

	Age	Q l/mn		IC l/mn/m2		FC cpm		IS ml/m2		VO2 ml/mn	
		repos	effort	repos	effort	repos	effort	repos	effort	repos	effort
BOU.	74	5,81	12,70	3,01	6,58	80	98	38	67	130	440
BOUR.	67	5,12	12,82	3,14	7,86	71	126	45	62	130	502
DUB.	57	6,03	12,43	3,84	7,92	76	139	51	57	138	485
DUP.	63	6,54	10,33	3,37	5,32	85	113	40	47	150	396
MOR.	66	5,01	7,72	3,17	4,89	92	111	35	50	154	422
PEY.	71	5,30	14,03	2,85	7,54	60	123	47	61	148	600
PRA.	62	3,56	12,81	2,27	8,16	83	137	27	59	146	652
ROC.	63	4,48	8,29	2,32	4,29	91	121	25	35	132	322
VER.	55	8,26	15,45	4,89	9,14	83	118	59	77	178	595
VUE.	64	5,13	7,71	2,93	4,40	65	86	54	51	157	361

$\bar{X}$ 64,6 5,52 11,43 3,18 6,61 78,6 117,2 42,1 56,6 146,3 477,5
 $\pm$ 55,8 $\pm$ 1,27 $\pm$ 2,75 $\pm$ 0,76 $\pm$ 1,76 $\pm$ 10,6 $\pm$ 16,3 $\pm$ 11,2 $\pm$ 11,6 $\pm$ 14,9 $\pm$ 110,0
 $\pm$ *** $\pm$ *** $\pm$ *** $\pm$ *** $\pm$ *** $\pm$ *** $\pm$ *** $\pm$ *** $\pm$ *** $\pm$ ***

HEMODYNAMIQUE
 METABOLIQUE
 ETAT BASAL

EFFORT

	Cap. O2 vol. p cent.		Sa O2 p cent.		Sv O2 p cent.		Ca O2 ml p cent.		Cv O2 ml p cent.	
	repos	effort X %	repos	effort X %	repos	effort X %	repos	effort	repos	effort
BOU.	21,88	22,89	82	81	62	51,5	17,70	18,31	13,37	11,63
BOU.	15,78	16,71	90,5	93	64	54,5	14,05	15,32	9,91	8,94
DUB.	22,56	24,74	77,5	69,5	61,5	44,5	17,26	16,99	13,60	10,87
DUP.	19,01	20,21	90,5	92,5	67	55,5	16,97	18,47	12,53	11,04
MOR.	22,09	24,43	88	89	66	53,5	19,22	21,52	14,38	12,90
PEY.	18,02	18,72	92	90	63	47	16,36	16,62	11,16	8,66
PRA.	24,46	25,64	85,5	78	59	46,5	20,67	19,77	14,25	11,70
ROC.	21,27	22,70	82,5	79	55,5	45,5	17,30	17,70	11,63	10,19
VER.	21,64	23,52	83,5	79	66,5	51	17,83	18,35	14,19	11,84
VUE.	19,94	20,57	92,5	93	65,5	53	16,82	18,93	12,86	10,74

$\bar{X}$: m 20,67 22,01 86,5 84,4 63 50,3 17,62 18,20 12,80 10,86
 σ : + 2,52 + 2,87 + 5,0 + 8,2 + 3,7 + 4,0 + 1,77 + 1,72 + 1,50 + 1,32
p : — *** — — NS — — *** — — * — — *** —

HEMODYNAMIQUE METABOLIQUE
 ETAT BASAL
 EFFORT

$\Delta_{av} \bar{O}_2$ vol p cent		$\frac{\Delta_{av} \bar{O}_2}{Ca \bar{O}_2}$ p cent		$\bar{Q}_a \bar{O}_2$ ml/mm		$\bar{Q}_v \bar{O}_2$ ml/mm	
repos	effort	repos	effort	repos	effort	repos	effort
4,33	6,60	24,46	36,48	530	1200	400	770
4,14	6,38	29,47	41,64	440	1200	310	700
3,53	6,12	20,74	36,02	660	1350	520	660
4,44	7,43	26,16	40,23	570	980	420	590
4,84	6,62	25,18	40,05	610	1050	460	630
5,20	7,96	31,78	47,89	470	1250	320	650
6,42	7,99	31,06	40,41	470	1610	320	960
5,67	7,51	32,77	42,43	400	760	270	440
3,64	6,51	20,42	35,48	870	1680	690	1080
5,36	8,19	28,48	43,26	550	830	380	470
$\bar{m}$ 4,76	7,34	26,99	40,39	557	1191	410	715
$\pm$ 0,91	$\pm$ 0,87	$\pm$ 4,33	$\pm$ 3,78	$\pm$ 136	$\pm$ 303	$\pm$ 124	$\pm$ 206
***		***		***		***	

X 6 P

HEMODYNAMIQUE
METABOLIQUE

14 SUJETS
NORMAUX

AGES DE 55 A 75 ANS

185

Obs. n°	IC l/m2	IS cc/m2	Cap O2 p cent	Sa O2 %	Sv O2 %	Ca O2 vol p cent	Cv O2 vol p cent
33	2,54	41	17,81	96	70	16,91	12,28
34	3,28	52	20,50	92,6	74,4	18,61	14,97
35	3,83	48	19,00	94,5	74,9	17,77	13,94
36	2,39	38	19,40	96,8	68,7	18,49	12,83
37	2,76	43	19,00	98,8	73,5	18,39	13,56
38	2,33	41	16,80	95,5	67,6	15,86	11,07
39	2,30	40	19,20	98,1	72,8	18,64	13,57
40	3,93	39	17,00	96,8	76,4	16,26	12,60
41	3,07	51	17,60	93,3	70,7	16,24	12,18
42	3,00	46	19,30	93,8	72,9	17,92	13,79
43	2,51	34	17,50	93,5	69,7	16,18	11,92
44	2,97	48	18,50	97,1	72,9	17,77	13,10
45	2,99	42	16,30	98,3	70,6	15,82	11,11
46	3,03	39	17,70	94,9	70,0	16,61	12,10
$\bar{X}$:	2,92 + -	43 + -	18,26 + -	95,71 + -	71,79 + -	17,26 + -	12,79 + -
σ :	0,51	5	1,19	2,01	2,55	1,10	1,11

$\Delta_{av} O_2$ p cent	$\Delta_{av} O_2$ $\frac{Ca O_2}{P}$ cent	$Q_{Ca} O_2$ ml/min	$Q_{VT} O_2$ ml/min	FC cpm	PAPE mmHg	IS ml/m2	$\overline{PAO}$ mmHg	W syst VD/m2 gm/m2	W Syst VG/m2 gm/m2
4,63	27	430	312	63	15	52	99	10,6	70,0
3,84	20	617	491	79	16	48	102	10,4	66,6
3,83	22	681	534	63	17	38	124	8,8	64,1
5,66	31	442	307	64	14	43	93	8,2	54,4
4,83	26	508	374	62	19	41	108	10,6	60,2
4,79	30	370	258	57	18	40	106	9,8	57,7
5,07	27	429	312	100	12	39	105	6,4	55,7
3,66	23	639	495	60	19	51	118	13,2	81,8
4,06	25	499	374	65	17	46	106	10,6	66,3
4,13	23	538	414	73	13	34	97	6,0	44,8
4,26	26	406	299	61	12	48	84	7,8	54,8
4,67	26	528	389	70	13	42	102	7,4	58,3
4,71	30	473	332	77	12	39	99	6,4	52,5
4,51	27	503	367	64	18	47	102	11,5	65,8
4,48 + -	26 + -	505 + -	376 + -	68	15,4 + -	43	103,2 + -	9,12 + -	60,93 + -
0,55	3	91	83		2,6		6,7	2,17	9,07

HEMODYNAMIQUE PRESSIONS DROITES AIR / O₂

AGE	Q l / mn		P O D mmHg		P V D S mmHg		P V D td mmHg		W syst VD	
	Air	O ₂	Air	O ₂	air	O ₂	Air	O ₂	Air	gm/m ²
74	5,81	4,54	- 3	-	20	-	- 2	-	8,5	
67	5,12	6,73	0	-	25	-	-	-	6,7	
57	6,3	5,15	3,75	-	45	-	11	-	23,2	
63	6,54	4,79	- 1	-	20	-	- 1	-	7,6	
65	2,93	3,23	1	-	20	-	1	-	4,9	
75	4,33	4,96	0,75	-	21	-	3	-	13,1	
69	4,07	3,57	0	-	25	-	- 5	-	7	
61	3,58	3,04	3	-	42	-	8	-	11	
68	6,40	3,70	4	-	90	-	5	-	37,5	
66	4,45	4,94	- 0,5	-	42	-	2	-	18,1	
66	5,01	4,17	- 1,5	-	35	-	- 1	-	9	
71	5,30	6,12	0	-	25	-	2	-	8	
62	3,56	5,56	- 0,5	-	42	-	1	-	8,8	
53	3,50	4,47	0,5	-	65	-	0	-	14,3	
63	4,48	4,83	4,5	-	55	-	2	-	17	
64	5,14	8,79	0	-	27	-	0	-	7,1	
55	8,26	7,66	- 0,5	-	30	-	2	-	14	
64	5,13	6,00	- 2	-	22	-	- 5	-	12,9	

BOUD ...
 BOUR ...
 DUBO ...
 DUPO ...
 DUPR ...
 GOL ...
 GUIL ...
 LEO ...
 MER ...
 MIC ...
 MOR ...
 PEY ...
 PRA ...
 RES ...
 ROC ...
 SOR ...
 VER ...
 SUE ...

$\bar{x}$ 64,6 4,98 5,13 0,7 36,2 12,29
 σ $\pm$ 5,8 $\pm$ 1,31 $\pm$ 1,51 $\pm$ 1,9 $\pm$ 18,7 $\pm$ 2,96
 L NS J

P

HEMODYNAMIQUE PRESSIONS DROITES AIR / O₂ (suite)

	P A P S mmHg					P A P d mmHg				
	A i r		O ₂			A i r		O ₂		
	réel	théor.	%	réel	théor	%	réel	théor	%	%
BOUD ...	22,5	26,9	84	25	23,4	107	8,5	11,4	74	101
BOUR ...	24	23,8	101	16	27,8	58	4	9,8	40	17,2
DUBO ...	50	24,0	208	51	22,2	230	22,5	9,6	234	241
DUPO ...	24,5	26,4	93	20	22,3	90	8,5	10,9	78	82
DUPR ...	25	18,2	137	27,5	18,9	146	5	7,1	70	101
GOL ...	41	23,0	178	40	24,8	161	11	9,7	113	143
GUIL ...	30	21,5	140	26	20,2	129	10	8,8	114	93
LEO ...	50	19,3	259	57,5	18,1	318	21,5	7,4	291	362
MER ...	90	27,1	332	72,5	20,4	355	30	11,4	263	274
MIC ...	55	21,9	251	47,5	23,2	205	28,5	8,9	320	266
MOR ...	26,5	23,4	113	23,5	21,3	110	10,5	9,6	110	116
PEY ...	29	24,9	116	37,5	27,1	138	7,5	10,4	72	88
PRA ...	41	19,2	214	41,5	23,9	174	14	11,2	125	119
RES ...	75	18,2	412	64	20,1	318	35	6,7	522	461
ROC ...	65	21,6	301	52	22,4	232	32,5	8,7	374	298
SOR ...	32,5	23,3	139	25	31,9	78	9	9,4	96	67
VER ...	30	28,2	106	30	26,9	112	10	11,4	88	92
VUE ...	30	23,3	129	32,5	25,4	128	10	9,4	107	120

$\bar{x}$	41,2	22,5	38,3	23,4	15,4	9,5	14,8	9,4
σ	+ 19,5	+ 4,5	+ 16,1	+ 3,5	+ 10	+ 1,5	+ 8,9	+ 1,8
p	***	***	***	***	*	*	***	***
							NS	

HEMODYNAMIQUE PRESSIONS DROITES AIR / O₂ (suite)

	P A P mmHg			P C P mmHg			P A P - P C P mmHg		
	A i r %		O ₂	A i r %		O ₂	A i r %		O ₂
	réel	théor		réel	théor		réel	théor	
BOUD	16,5	18,0	92	18,5	15,5	119	15,5	238	5,8
BOUR	11	15,6	71	8,5	9,6	46	1,5	25	6,9
DUBO	33,5	15,6	215	33	9,2	231	26,5	414	6,0
DUPO	14	17,5	80	13,5	10,7	93	9,0	132	5,8
DUPR	15	11,5	130	14	6,8	116	10,5	223	5,0
GOL	23	15,2	150	21,5	9,5	131	12,0	211	6,0
GUIL	19	14,0	136	17,5	8,5	135	15,0	273	5,1
LEO	31	12,3	252	38	7,2	333	22,0	431	4,8
MER	53	18,1	293	41	11,3	311	47,0	691	5,3
MIC	46	14,3	322	33,5	8,7	220	44,0	786	6,0
MOR	19	15,3	124	17	9,3	123	19,0	317	5,5
PEY	12,5	16,5	76	19,5	10,4	108	8,5	139	6,7
PRA	24	12,3	195	23	7,2	146	18,0	353	3,02
RES	50	11,4	439	43	6,4	336	49,0	980	5,6
ROC	49	14,0	350	36	8,4	247	45,0	804	5,9
SOR	21	15,3	137	17	9,2	79	20,0	328	8,1
VER	17,5	18,6	94	16,5	10,9	93	14,0	182	7,3
VUE	17,5	15,2	115	21	9,2	126	13,5	225	6,5

$\bar{x}$

26,3 15,0

24,0 15,3

4,6 9,1

4,7 9,2

21,7 5,9

19,3 5,6

σ_p

+ 14,1 + 2,2

+ 10,5 + 2,6

+ 3,1 + 1,5

+ 3,3 + 1,8

+ 14,6 + 0,8

+ 9,8 + 1,5

NS

NS

NS

NS

NS

HEMODYNAMIQUE PRESSIONS DROITES AIR / O2 (suite)

	R P T dynes / s/ cm ⁻⁵				R A P dynes / s/ cm ⁻⁵				
	A i r		O 2		A i r		O 2		
	réel	théor. %	réel	théor. %	réel	théor. %	réel	théor. %	
BOUD ...	227	248	92	119	213	89	239	102	259
BOUR ...	179	244	73	46	31	94	33	82	109
DUBO ...	444	207	214	231	351	85	413	93	417
DUPO ...	170	214	79	93	110	83	133	97	155
DUPR ...	409	314	130	116	286	128	223	124	210
GOL ...	424	281	151	131	221	105	210	97	249
GUIL ...	371	275	135	135	293	108	271	114	324
LEO ...	692	275	252	333	491	114	431	126	563
MER ...	661	226	292	311	586	85	689	114	635
MIC ...	824	257	321	220	788	101	780	97	492
MOR ...	302	244	124	123	302	96	315	105	292
PEY ...	188	249	76	108	128	92	139	87	157
PRA ...	538	276	195	146	404	114	354	91	300
RES ...	1141	260	439	336	1119	114	982	100	769
ROC ...	874	250	350	246	803	100	803	98	490
SOR ...	326	238	137	79	311	95	328	74	209
VER ...	169	180	94	84	135	75	180	76	117
VUE ...	272	237	115	126	210	93	226	87	245

$\bar{x}$ 456,2 248,6
 $\pm$ 280 $\pm$ 31
 NS NS

419,9 247
 $\pm$ 253 $\pm$ 34
 NS

377 87
 $\pm$ 284 $\pm$ 32
 NS

339 93
 $\pm$ 216 $\pm$ 26
 NS

POD mmHg		PVDS mmHg		PVDtd _{mmHg}		PAP _a mmHg		PAPd mmHg		
repos	effort	repos	effort	repos	effort	repos	effort	repos	effort	%
- 3	1	20	-	- 2	-	22,5	48	10	19	190
0	1,5	25	-	-	-	24	30	2	8	400
3,75	10	45	110	11	14	50	115	21	55	262
- 1	- 1	20	-	- 1	-	24,5	26	6	13	217
- 1,5	0	35	-	- 1	-	26,5	42	10	20	200
0	0	25	-	2	-	29	50	10	17	170
- 0,5	0	42	-	1	-	41	100	11,5	27	235
4,5	8	55	-	2	-	65	95	26,5	55	208
- 0,5	1	30	-	2	-	30	65	10	30	300
- 2	3,5	22	-	- 5	-	30	50	12,5	20	160

$\bar{X}$: 1,7 2,9 32 2,7 34,3 62,1 11,9 26,4
 σ : ± 13,7 ± 30,8 ± 7 ± 16,3
 r : *** *** ***

				dynes/s-l/cm-5			
repos		effort		repos		effort	
réel	théor.	réel	théor.	réel	théor.	réel	théor.
16,5	18,0	33,5	31,7	1,0	11,5	16,5	21,6
11,0	15,6	23	29,5	9,5	9,6	18,5	19,0
33,5	15,6	77,5	25,4	7,0	9,2	36,0	15,4
14,0	17,5	21,5	23,9	5,0	10,7	3,5	14,9
19,0	15,3	30	20,1	0,0	9,3	12,5	12,6
12,5	16,5	31,5	33,2	4,0	10,4	16,5	21,9
24,0	12,3	59	27,7	6,0	7,2	13,0	17,4
49,0	14,0	72	20,4	4,0	8,4	9,0	12,6
17,5	18,6	42,5	29,2	3,5	10,9	13,0	17,5
17,5	15,2	31,5	19,7	4,0	9,2	20,0	12,2

$\bar{X}$ 21,5	15,9	26,1	4,4	9,6	15,8	16,5	17,9	6,2	26,4	9,6
$\sigma \pm 11,6$	$\pm 1,9$	$\pm 20,2$	$\pm 2,7$	$\pm 1,3$		$\pm 11,5$	$\pm 0,7$		$\pm 18,4$	$\pm 1,5$
ρ	L^{***}	L^{***}	L^{***}	L^{***}	L^{***}	L^{***}	L^{***}	L^{NS}	L^{NS}	L^{NS}

repos		effort		repos		effort		R A P dynes/S-l/cm-5		effort		W Syst VD gm/m2	
réel	théor.	réel	théor.	réel	théor.	réel	théor.	réel	théor.	réel	théor.	repos	effort
227	248	211	199	213	89	107	64					8,5	30,5
179	244	143	184	31	94	28	65					6,7	19,4
444	207	498	163	351	85	267	64					23,2	60,1
170	214	166	185	110	83	139	70					7,6	13,7
302	244	310	208	302	96	181	78					9,0	20,4
188	249	179	189	128	92	85	64					8,0	26,1
536	276	368	173	404	114	287	64					8,8	47,3
874	250	694	197	803	100	607	75					16,7	34,3
169	180	220	151	135	75	153	61					14,0	44,5
272	237	326	204	210	93	119	78					12,9	21,9
336	235	312	185	269	92	197	68					9,54	26,7
± 226	± 27	± 173	± 18	± 221	± 11	± 164	± 6,5					±	±
		MS		NS		NS						3,57	
												14,6	
												L * * *	

HEMODYNAMIQUE PRESSIONS GAUCHES AIR / O₂

	P A o S mmHg		P A o d mmHg		P A o mmHg		P V G S mmHg		P V G t d mmHg	
	Air	O ₂	Air	O ₂	Air	O ₂	Air	O ₂	Air	O ₂
BOUD...	110	-	70	-	94	-	130	135	3,4	6,3
BOUR...	125	-	65	-	90	-	132,5	132,5	6	8
DUBO...	120	-	70	-	95	-	125	137,5	12	13,5
DUPO...	140	-	70	-	96,5	-	127,5	140	1	3
DUPR...	115	135	55	65	82,5	95	127,5	135	8	7
GOL ...	170	170	70	80	106	115	145	180	7,7	9,8
GUIL...	95	110	50	65	72,5	85	100	110	3,9	0,7
LEO ...	120	130	80	90	95	105	125	130	18	23,5
MER ...	110	115	45	45	75	75	102,5	125	5,9	7,4
MIC ...	130	145	65	80	98	105	115	145	6	8
MOR ...	115	115	65	65	87,5	90	120	120	1,3	2,8
PEY ...	115	-	55	-	76,5	-	127,5	157,5	10	14
PRA ...	150	155	75	75	102,5	110	135	144	5	3,4
RES ...	85	-	60	-	73,5	-	100	95	2,5	4,3
ROC ...	115	105	70	65	90	80	102,5	105	4,5	7,5
SOR ...	105	110	70	75	90	90	100	105	1,0	3,6
VER ...	120	-	70	-	90	-	112,5	125	1,9	8,1
VUE ...	155	-	70	-	107,5	-	145	175,3	4,2	6,5

$\bar{x}$	122	130,6	65,3	71,1	90,1	96,3	119,5	133,1	5,6	7,5
σ	+ 20,9	+ 22,7	+ 8,9	+12,9	+ 10,7	+13,1	+ 15,4	+ 22,7	+ 4,4	+ 5,4
p										

[illegible]

HEMODYNAMIQUE GAUCHE Air / O₂

	Res Art System			P V G S x F C (travail systolique interne)		
	A i r	O ₂ dynes / s / cm ⁻⁵	%	A i r	O ₂ dynes / s / cm ⁻⁵	%
BOUD...	1293	-	-	9161	10 130	111
BOUR...	1405	-	-	7616	7 134	94
DUBO...	1259	-	-	9240	10 810	117
DUPO...	1177	-	-	10416	10 413	100
DUPR...	2250	2343	104	10455	10 260	98
GOL ...	1956	1852	95	8531	10 436	122
GUIL...	1416	1960	138	10483	9 092	87
LEO ...	2120	2976	140	10831	10 440	96
MER ...	935	1566	167	8715	8 839	101
MIC ...	1756	-	-	13167	15 718	119
MOR ...	1393	1845	132	11776	12 520	98
PEY ...	1153	-	-	7112	11 979	168
PRA ...	2300	1542	67	12030	12 190	101
RES ...	1675	-	-	10340	10 055	97
ROC ...	1606	1464	91	8781	8 905	101
SOR ...	1400	828	59	11185	12 496	112
VER ...	870	-	-	8547	9 363	110
VUE ...	1670	-	-	8995	11 598	129

$\bar{x}$	1535	1781
σ	419	363
p	+	+
	NS	NS

HEMODYNAMIQUE GAUCHE Air / O₂

(P V G S - P V G t d) x I S x 13,6 (travail systolique externe V G)

	A i r	$\frac{g m}{m^2}$	0 2	%
BOUD ...	65		51	78
BOUR ...	77		107	139
DUBO ...	78		81	104
DUPO ...	69		56	81
DUPR ...	39		50	128
GOL ...	78		118	151
GUIL ...	35		37	106
LEO ...	38		26	68
MER ...	68		57	84
MIC ...	43		63	147
MOR ...	56		46	82
PEY ...	75		82	109
PRA ...	48		86	179
PES ...	28		36	129
ROC ...	33		38	115
SOR ...	34		60	176
VER ...	89		95	107
VUE ...	103		117	114
$\bar{X}$	59		67	
$\pm$	22		$\pm$	

5

p

— * —

	PAo mmHg										RAS dynes/cm-5														
	PAOs mmHg					PAOd mmHg					repos			effort			repos			effort					
	repos		effort		%	repos		effort		%	repos		effort		%	repos		effort		%	repos		effort		%
	r��el	th��or.	r��el	th��or.		r��el	th��or.	r��el	th��or.		r��el	th��or.	r��el	th��or.		r��el	th��or.	r��el	th��or.		r��el	th��or.	r��el	th��or.	
BOJD	110	148	70	84	94,0	104,7	90	110	126,4	87	1293	1437	90	692	795	87									
BOUR	125	190	65	87	90,0	101,8	88	140	124,8	112	1405	1589	88	873	778	112°									
DUB	120	172	70	92	95,0	103,2	92	120	120,8	99	1259	1368	92	772	777	99									
DUP	140	162	70	85	96,5	105,5	91	122,5	116,4	105	1179	1289	91	948	901	105°									
FOR	115	145	65	80	87,5	101,4	86	100	109,4	91	1396	1618	86	1035	1133	91									
PTY	115	175	55	90	76,5	102,8	74	132,5	129,7	102	1154	1550	74	755	739	102°									
PRA	150	235	75	108	102,5	96,8	106	165	123,3	134	2101	2173	106°	1029	769	134°									
ROC	115	130	70	80	90,0	99,5	90	100	110,5	90	1606	1775	90	964	1065	91									
VTR	120	128	70	80	90,0	109,0	83	96,5	128,5	75	871	1055	83	499	665	75									
VUE	155	210	70	98	107,5	101,5	106	137,5	109,0	126	1675	1581	106°	1425	1130	126°									

X	126,5	169,5	68	88,4	93,0	102,6	122,4	120,0	1414	1544	899	875
+	16,0	+ 34,6	+ 5,4	+ 9,0	+ 8,5	+ 3,3	+ 21,8	+ 8,0	+ 387	+ 158	+ 249	+ 172
p	***	***	***	***	NS	NS	NS	NS	***	NS	NS	NS

HEMODYNAMIQUE GAUCHE

P V G S mmHg		P V G td mmHg		théorique (PCP)
Repos	Effort	Repos	Effort	
130	150	3,4	12,6	21,6
132,5	200	6	22,4	19,0
125	172	12	18,3	15,4
127,5	170	1	3,8	14,9
120	150	1,3	8,6	12,6
127,5	-	10	16,5	21,9
135	220	5	17	17,4
102,5	130	4,5	8	12,6
112,5	125	1,9	12	17,5
145	225	4,2	27	12,2

BOUD, ...
 BOUR, ...
 DUB ...
 DUP ...
 MOR ...
 PEY ...
 PRA ...
 ROC ...
 VER ...
 VUE ...

$\bar{x}$

125,8 171,3

s

± 11,9 ± 36,8

p

*** ***


16,5

14,4

± 7,4


HEMODYNAMIQUE GAUCHE Repos/Effort


	PVGS x FC		W syst externe VG gm/m		TE m s		Taux d'Ejection l	
	Repos	Effort	Repos	Effort	Repos	%	Repos	Effort
BOUD...	9161	15 788	65	125	256	88	0,148	0,261
BOUR...	-	-	77	150	343	117	0,131	0,248
DUB ...	9240	22 252	78	119	276	97	0,185	0,268
DUP ...	10416	17 280	69	106	296	104	0,135	0,196
MOR ...	-	-	56	96	242	89	0,145	0,235
PEY ...	7112	-	75	-	306	99	0,154	0,269
PRA ...	12030	28 127	48	163	267	95	0,101	0,258
ROC ...	8781	17 152	33	58	259	99	0,097	0,151
VIER ...	8547	14 875	89	118	284	103	0,208	0,294
VUE ...	8995	17 661	103	137	282	94	0,191	0,177
X	9285	19 019	69	119	281		0,149	0,236
±	± 1436	± 4 643	± 20,2	± 30,9	± 29,1	±	± 0,037	± 0,046
p	***	***	***	***	***	***	***	***



PAP/PCP

AIR REPOS : ○ r =
0,0035
O₂ : Δ r =
0,354
EFFORT : × r =
0,416






0

0


0


0




PAP / 100 - SaO2 r = 0,746
PCP / 100 - SaO2 r = 0,215
 Etat basal

PAP	effort	○	mmHg
PCP	effort	Δ	mmHg







réel
AIR


mmHg

PCP


PVQ d

$r = 0,536$ X REPOS

$r = 0,631$ Δ EFFORT



PVG d mmHg



Nous envisagerons successivement les données observées à l'état basal $n = 18$, celles recueillies à l'effort ($n = 10$) et celles observées au cours d'une inhalation d' O_2 100 p cent pendant 20mn.

ETAT BASAL

A - Ensemble du groupe de 18 patients -

1) Les 18 patients atteints de BPCO sont caractérisés sur les plans clinique et fonctionnel respiratoire par:

- l'absence de signes cliniques, d'insuffisance cardiaque au moment de l'investigation -
- un syndrome bronchoobstructif marqué
- une hypoxémie discrète ou franche (17 sur 18)
- une hypercapnie discrète ou franche (13 sur 18)
- une hypoventilation alvéolaire attestée par une corrélation très positive entre le taux de désaturation oxyhémoglobinée et le degré d'hypercapnie ($r = 0,891$ ***)

2) Sur le plan hémodynamique par

a) une capacité du sang en O_2 légèrement accrue

- un débit cardiaque normal
- un débit d'oxygène disponible sensiblement identique à celui des sujets normaux de même âge
- un taux d'extraction d' O_2 tissulaire légèrement accru

Ces constatations permettent de souligner le rôle bénéfique des réajustements biologiques et hémodynamiques destinés à compenser l'hypoxémie et à assurer une oxygénation tissulaire satisfaisante

b) une compétence ventriculaire droite normale (16/18)

- une hypertension pulmonaire précapillaire avec résistances artérielles pulmonaires élevées de degré variable
- un travail systolique ventriculaire droit accru en valeur moyenne pour l'ensemble du groupe, mais normal dans 50% des cas
- une indépendance de la PAP et de la PVDtd ($r = 0,300$)

Ces constatations permettent de préciser que le retentissement hémodynamique de la BPCO se situe électivement au niveau artériolaire pulmonaire

La PCP n'est pas corrélée avec la PAP ($r = -0,008$) mais la PAP est hautement corrélée avec le gradient PAP - PCP ($r = 0,977$ ***)

D'autre part la PCP est indifférente aux désordres gazométriques, mais la PAP et le gradient PAP - PCP sont nettement liés à l'hypoxémie (***) et à l'hypercapnie (**), soulignant ainsi le rôle de l'hypoventilation alvéolaire dans la genèse de l'hypertension pulmonaire.

[illegible][illegible]

100

- La corrélation trifactorielle ($PAP = f(100 - SaO_2) + H^+$) confirme les données établies par ENSON et FERRER (1964-1965) mais révèle la prépondérance de l'effet hypoxique sur le taux d'hypertension pulmonaire.
(élévation de 11mmHg de la PAP pour 10% de désaturation oxyhémoglobinée
élévation de 2,5 mmHg de la PAP pour un accroissement de 10 nM/L d'ions (H^+))
- c) Les pressions systémiques (Aortiques) sont en valeur moyenne, normales, inférieures aux valeurs théoriques tenant compte de l'âge et du débit cardiaque. Cependant 3 sujets peuvent être considérés comme discrètement hypertendus ($PAo = 106\%$ de la valeur théorique).
- Les résistances systémiques sont en règle inférieures aux valeurs théoriques.
- La pression ventriculaire gauche télédiastolique (PVGtd) est normale (inférieure à 12mmHg) sauf dans 2 cas où elle atteint 12,5 et 18mmHg.
- Le travail systolique ventriculaire gauche est superposable à celui observé chez les sujets normaux du même âge.
- L'index de contractilité ($\frac{dp}{dt}$) est normal sauf dans 1 cas (inférieur à 20 cycles s^{-1}) PI

Ces constatations permettent d'établir que sur 18 cas, 1 seul malade présente une diminution concordante de la compliance et de la contractilité ventriculaire gauche; un deuxième patient est affecté d'une discrète diminution de la compliance ventriculaire gauche.

Pour l'ensemble du groupe de 18 malades, la PVGtd demeure indépendante des désordres gazométriques ($SaO_2 : r = -0,144$
 $PaCO_2 : r = -0,123$)
et du taux d'hypertension artérielle pulmonaire ($r = 0,005$)

La concordance de PCP et de PVGtd ($r = 0,623 **$) précise la fiabilité de l'estimation de la PVGtd par la mesure de la PCP.

Il semble, d'autre part, que l'augmentation du barrage artériolocapillaire ($PAP - PCP$) et son corollaire $100 - SaO_2$ soient susceptibles d'amenuiser la pression systolique du VG (PVGS) $r = -0,629$ et $-0,685 **$.

Une liaison paraît s'établir entre la PVGtd et la PVDtd ($r = 0,655 **$). Une telle corrélation déjà mentionnée par BAUM (1971) est intéressante à souligner mais demande d'autres confrontations établies chez des patients parvenus au stade de la décompensation cardiaque.

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β . It is shown that the system has solutions for all values of the parameters α and β if the function $f(x)$ is continuous and has a bounded derivative.

2. In the second part of the paper the problem of the uniqueness of solutions of the system of equations (1) is considered. It is shown that the system has a unique solution for all values of the parameters α and β if the function $f(x)$ is continuous and has a bounded derivative.

3. In the third part of the paper the problem of the stability of solutions of the system of equations (1) is considered. It is shown that the system has stable solutions for all values of the parameters α and β if the function $f(x)$ is continuous and has a bounded derivative.

4. In the fourth part of the paper the problem of the asymptotic behavior of solutions of the system of equations (1) is considered. It is shown that the system has asymptotically stable solutions for all values of the parameters α and β if the function $f(x)$ is continuous and has a bounded derivative.

5. In the fifth part of the paper the problem of the periodicity of solutions of the system of equations (1) is considered. It is shown that the system has periodic solutions for all values of the parameters α and β if the function $f(x)$ is continuous and has a bounded derivative.

6. In the sixth part of the paper the problem of the bifurcation of solutions of the system of equations (1) is considered. It is shown that the system has bifurcating solutions for all values of the parameters α and β if the function $f(x)$ is continuous and has a bounded derivative.

7. In the seventh part of the paper the problem of the chaos of solutions of the system of equations (1) is considered. It is shown that the system has chaotic solutions for all values of the parameters α and β if the function $f(x)$ is continuous and has a bounded derivative.

8. In the eighth part of the paper the problem of the ergodicity of solutions of the system of equations (1) is considered. It is shown that the system has ergodic solutions for all values of the parameters α and β if the function $f(x)$ is continuous and has a bounded derivative.

- l'indice de la contractilité dp/dt n'est affecté ni par les désordres gazométriques PI (r inférieur ou égal à 0,300) ni par les pressions artérielles pulmonaires (r inférieur à 0,400); en revanche, il tend à s'amenuiser lorsque la PVGtd augmente ($r = -0,531$), confirmant ainsi la baisse de inotropisme ventriculaire lorsque la compliance diminue.

EN RESUME: la fonction ventriculaire gauche évaluée sur des mesures élémentaires chez 18 patients indemnes d'IVD actuel apparaît dans la grande majorité des cas, normale, indépendante des troubles gazométriques et du retentissement de la pneumopathie chronique sur la circulation pulmonaire.

La diminution concordante de la compliance et de la contractilité ventriculaire gauche observée chez un seul patient apparaît fortuite.

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

- B - Parmi les 18 patients étudiés, il nous a paru intéressant d'isoler les sujets présentant un facteur de risque de cardiopathie ventriculaire gauche et de les comparer aux autres patients indemnes d'un tel facteur de risque.

C'est ainsi que la fonction ventriculaire gauche de 8 sujets (HTA discrète - diabète - coronaropathie) est confrontée aux données recueillies chez les 10 malades restants.

Nous n'avons trouvé aucune différence sensible en ce qui concerne la PCP, la PVGtd, et l'indice $dp/dt/PI$ bien qu'il soit noté dans le groupe comportant un facteur de risque, une pression ventriculaire gauche systolique plus élevée, une tendance à l'augmentation du travail systolique VG et à l'accroissement des résistances systémiques.

Il semble, en conséquence, que la présence d'une HTA (discrète) ou d'une coronaropathie chez les sujets atteints de BPCO, n'accroissent pas le risque d'une dysfonction ventriculaire gauche. Il convient cependant de souligner que dans le groupe des 8 malades comportant un facteur de risque de cardiopathie ventriculaire gauche, les désordres gazométriques et l'hypertension pulmonaire apparaissent moins sévères que dans le groupe témoin. Une telle disparité peut perturber l'évaluation et conduit à tempérer les conclusions précédentes.

- C - Une autre hypothèse de travail était de considérer les antécédents de poussées de défaillance ventriculaire droite comme un facteur de risque supplémentaire capable de favoriser une dysfonction du ventricule gauche.

À cet effet, 10 sujets affectés d'antécédents d'IVD sont comparés à 8 patients n'ayant jamais présenté de décompensation cardiaque.

Ici encore nous n'avons trouvé aucune différence sensible en ce qui concerne la PCP, la PVGtd et l'indice $dp/dt/PI$, bien que le groupe des sujets affectés d'antécédents d'IVD soit significativement plus sévèrement atteint que le groupe témoin (SaO_2 plus basse, hypercapnie et acidose plus élevées, hypertension artérielle pulmonaire plus marquée, travail systolique ventriculaire droit plus intense)

Les comparaisons qui viennent d'être rapportées confirment que, chez les 18 patients atteints de BPCO de gravité variable, ni les facteurs de risque vasculaire, ni les antécédents de décompensation cardiaque, ne permettent d'authentifier à l'état basal et en dehors de toute insuffisance cardio respiratoire une anomalie fonctionnelle du ventricule gauche.

Le stress engendré par l'épreuve d'exercice musculaire revêt un très grand intérêt car il sollicite la mise en jeu de l'adaptation cardiocirculatoire et permet d'évaluer les réserves fonctionnelles du myocarde.

Il convient toutefois de souligner que l'intensité de l'effort supporté par les malades atteints de BPCO sévère est généralement très modeste, triplant en moyenne la consommation d'oxygène basale, et que le régime stable ne peut être obtenu que dans un petit nombre de cas.

C'est la raison pour laquelle les documents recueillis au cours de l'effort ne concernent que 10 sujets dont la condition cardiorespiratoire est, bien entendu, moins détériorée que chez les patients incapables de réaliser le test.

Chez ces 10 malades, l'effort engendre une baisse significative de la PaO_2 , une désaturation oxyhémoglobinée dans 60% des cas et une aggravation de l'hypercapnie dans 80% des cas.

- L'hypoventilation alvéolaire persiste ($r = 0,872$ *** entre SaO_2 et $PaCO_2$).

- L'augmentation du débit cardiaque, comparée à celle des sujets normaux du même âge est très satisfaisante: la valeur observée au cours de l'effort atteint le double de la valeur basale.

- L'augmentation du volume systolique est nettement significative

- Grâce à une augmentation significative de la capacité du sang en oxygène (+ 1,3 vol p cent en moyenne) le débit d'oxygène utilisable ($QaO_2 = 1191 \text{ ml/m}^2/\text{mn}$) est superposable à celui observé chez les sujets normaux de même âge ($1016 \text{ ml/m}^2/\text{mn}$) rendant peu probable une hypoxie tissulaire d'effort.

- Les pressions systoliques, diastoliques et moyennes de l'artère pulmonaire atteignent une valeur double de la valeur basale. Elles sont toujours nettement supérieures aux valeurs théoriques obtenues chez des sujets de même âge et ayant un débit cardiaque identique.

La PAP est étroitement corrélée avec SaO_2 ($r = 0,882$ ***), $PACO_2$ ($r = 0,755$ **) et H^+ ($r = 0,727$ **)

- La pression capillaire pulmonaire subit une nette augmentation atteignant une valeur approximativement triple de la valeur basale.

Si on compare les données recueillies chez les patients à la PCP théorique tenant compte de l'âge et du débit cardiaque, les valeurs moyennes sont identiques. La PCP n'apparaît franchement pathologique (supérieure à 20mmHg) que chez 2 patients.

La PCP est indépendante de l'hypoxie, de l'hypercapnie et de la PAP.

- Les résistance artérielles pulmonaires baissent légèrement mais demeurent néanmoins anormalement élevées par rapport aux valeurs théoriques.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1911

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO

- Les pressions systémiques (aortiques) s'élèvent significativement comme cela est la règle au cours de l'exercice musculaire.

4 sujets sur 10, dont la pression systémique atteint une valeur supérieure à la valeur théorique peuvent être considérés comme des hypertendus potentiels. L'élévation des pressions systémiques est indépendante des troubles gazométriques.

- La pression ventriculaire gauche télédiastolique (PVGtd) suit l'évolution de la PCP : la valeur basale est triplée.

Mais, par rapport aux valeurs théoriques, 2 malades seulement peuvent être crédités d'une élévation anormale de la PVGtd, (supérieure à 20mmHg). La PVGtd comme la PCP est totalement indépendante de l'hypoxie, de l'hypercapnie et de l'élévation de la PâP.

- L'expression graphique des pentes de fonction ventriculaire gauche établie entre le travail systolique ventriculaire gauche et la pression ventriculaire gauche télédiastolique au repos et au cours de l'effort, fait apparaître un léger aplatissement de la pente chez 3 sujets: 1 sujet ayant des antécédents d'IVD, 1 sujet hypertendu, 1 sujet atteint d'HTA et de coronaropathie.

- Les indices de la contractilité n'ont pas été enregistrés au cours de l'effort.

En conséquence, l'épreuve d'effort détecte chez 10 patients 3 cas de dysfonction ventriculaire gauche: chez 2 d'entre eux une pathologie ventriculaire gauche autonome indépendante de l'affection respiratoire, peut être suspectée.

L'élévation de la PCP et de la PVGtd n'apparaît pas liée à l'hypoxie, à l'hypercapnie ou au degré d'hypertension pulmonaire.

The first part of the paper is devoted to a general
discussion of the problem. It is shown that the
problem is equivalent to the problem of finding
the minimum of a certain functional.

In the second part of the paper, the problem is
solved for the case of a certain class of functions.
It is shown that the minimum is attained at a
certain point.

In the third part of the paper, the problem is
solved for the case of a certain class of functions.
It is shown that the minimum is attained at a
certain point.

In the fourth part of the paper, the problem is
solved for the case of a certain class of functions.
It is shown that the minimum is attained at a
certain point.

INHALATION D' OXYGENE 100 p cent -

L'utilisation de l'inhalation d'oxygène dans la thérapeutique de certaines affections cardiaques ou pulmonaires a conduit de nombreux auteurs à étudier les effets de l'oxygène sur les différents paramètres circulatoires et respiratoires.

Le tableau A tente de résumer les effets de l'inhalation d'O₂ 100% mentionnés dans la littérature d'une part chez les sujets normaux, d'autre part chez les malades atteints de BPCO.

Les difficultés d'un tel recensement apparaissent d'emblée: les renseignements fournis ne concernent qu'un petit nombre de paramètres sur un nombre restreint d'observations; l'intérêt des auteurs porte soit sur la ventilation, soit sur la circulation systémique, soit sur la circulation pulmonaire.

La méthodologie employée est variable; le temps d'inhalation n'est pas toujours précisé, la mesure du débit cardiaque fait appel à des méthodes disparates (principe de Fick, dilution de colorants ou d'isotopes, ballistocardiographie, méthode à l'acétylène).

Le principe de Fick tel qu'il est utilisé dans notre étude est passible de critiques: la consommation d'oxygène est en l'occurrence difficile à contrôler. L'assimilation de la VO₂ sous O₂ à la VO₂ sous air ambiant employée par Karetzky (1971) et par nous mêmes, n'est peut-être pas le reflet de la réalité.

Les données concernant l'hémodynamique du cœur gauche ne sont pas, à notre connaissance, rapportées.

Malgré ces imperfections, certains faits paraissent bien établis:

- chez les sujets normaux l'inhalation d'O₂ 100 p cent engendre après une diminution initiale bien mise en évidence par Dejours (1962), une augmentation de la ventilation pulmonaire totale, ce qui explique l'éventualité d'une discrète alcalose respiratoire (Vale 1970, Karetzky 1971).

Le devenir de la PAP est pratiquement inconnu.

En revanche, la pression systémique augmente pour tous les auteurs dans des proportions modestes (9 références).

ainsi que la fréquence cardiaque (5 références);
l'index cardiaque diminue (9 références sur 10)
les résistances systémiques augmentent légèrement (5 références sur 6);

l'index systolique le plus souvent ne subit pas de variation (4 références sur 5);

- chez les sujets atteints de BPCO les résultats obtenus au cours de l'inhalation d'O₂ 100 p cent sont moins homogènes: le devenir de la ventilation totale est rarement signalé. Elle tend à diminuer (Tourniaire in Thèse de Faucon 1958, Horsfield 1968 et s' accompagne d'une tendance à l'acidose hypercapnique.

La PAP baisse pour la plupart des auteurs 5 références sur 6 ou évolue de façon variable (Tourniaire 1958).

Les résistances artérielles pulmonaires ont tendance à diminuer (3 références sur 4)

The first part of the report is devoted to a description of the general character of the country, and to a statement of the principal occupations of the people. It is then divided into two parts, the first of which is devoted to a description of the principal towns and cities, and the second to a description of the principal industries and occupations of the people. The report is then divided into two parts, the first of which is devoted to a description of the principal towns and cities, and the second to a description of the principal industries and occupations of the people.

The second part of the report is devoted to a description of the principal towns and cities, and to a statement of the principal occupations of the people. It is then divided into two parts, the first of which is devoted to a description of the principal towns and cities, and the second to a description of the principal industries and occupations of the people. The report is then divided into two parts, the first of which is devoted to a description of the principal towns and cities, and the second to a description of the principal industries and occupations of the people.

The third part of the report is devoted to a description of the principal towns and cities, and to a statement of the principal occupations of the people. It is then divided into two parts, the first of which is devoted to a description of the principal towns and cities, and the second to a description of the principal industries and occupations of the people. The report is then divided into two parts, the first of which is devoted to a description of the principal towns and cities, and the second to a description of the principal industries and occupations of the people.

- Les pressions systémiques sont rarement mesurées: leurs variations paraissent insignifiantes (3 références)
- L' index cardiaque subit une évolution discordante: diminution (3références sur 6) augmentation (2 références sur 6) sans changement (1 référence sur 6).
- La fréquence cardiaque diminue (1 référence)

Chez les 18 patients faisant l'objet de la présente étude,
l'inhalation d' O₂ 100 p cent fait apparaître les constatations suivantes :

- Sur le plan ventilatoire et hémodynamique métabolique
 - la ventilation totale (**) et la ventilation alvéolaire (***) sont significativement diminuées (14 % et 13% en moyenne); l'hypercapnie (**) et l'acidose (**) s'aggravent de façon significative (respectivement 10% et 7%).
 - la diminution de la fréquence cardiaque est modeste et non significative.
 - l'index cardiaque et l'index systolique ne subissent pas de variations concordantes.
 - le débit d'oxygène utilisable augmente de 33%, ce qui explique une franche diminution du taux d'extraction d'oxygène.
- Sur la circulation pulmonaire
 - la PAP et les résistances artériolaire pulmonaires subissent une diminution discrète et non significative ; malgré la correction de l'hypoxémie, les PAP demeurent pathologiques et restent positivement corrélées avec les ions H⁺ (*) et la PaCO₂ (**) plaidant en faveur d'un effet vasoconstricteur de l'acidose hypercapnique.
 - la PCP n'est pas affectée par l'inhalation d'oxygène et demeure indifférente aux ions H⁺, à l'hypercapnie et à la PAP.
 - Nous n'avons pas retrouvé , dans la présente étude, l'effet conjugué de l'oxygénation et des variations de l'hypercapnie qui pourraient expliquer , selon TOURNIAIRE et COLL (1958) la variabilité de la réponse artérielle pulmonaire à l'inhalation d'oxygène..

1. (1) 2 S)

- En revanche les corrélations différentielles font apparaître une liaison entre la baisse de la PAP et la diminution de la fréquence cardiaque, baisse d'autant plus sensible que la désaturation oxygénée est plus importante. La variation de la PAP apparaît indifférente aux variations modérées des ions H^+ et de la $PaCO_2$.
- L'abaissement de la PAP apparaîtrait ainsi tributaire d'un phénomène hémodynamique général et de la correction de l'hypoxémie.
- Sur la circulation systémique et coeur gauche
 - les résultats concernant la circulation systémique confirment les données de la littérature rapportées chez les sujets normaux:
 - la pression systémique ($\overline{PAo}$) augmente (7% *
 $n = 9$) ainsi que la PVG systolique (11% ***
 $n = 18$).
 - les résistances systémiques ont tendance à augmenter , mais la dispersion des valeurs et le petit nombre d'observations ($n=9$) expliquent que le test statistique ne soit pas significatif.
 - La PVGtd s'élève de façon concordante et très significative (***) de 34% en moyenne.
 - la PVGS et la PVGtd sont indifférentes aux ions H^+ et à l'hypercapnie, rendant peu probable un effet direct des désordres acido-basiques sur le coeur gauche.
 - Le travail systolique ventriculaire gauche, corollaire de l'élévation de la pression systémique subit une augmentation discrète de 13% en moyenne (*).
 - L'indice de contractilité $dp/dt/PI$ diminue faiblement, de 5% en moyenne, mais de façon concordante et significative (**). Sa variation est indifférente aux variations des ions H^+ ($r = - 0,273$) et de la $PaCO_2$ ($r = - 0,190$) ainsi qu'au taux de désaturation oxyhémoglobinée initial ($r = - 0,328$) rendant peu probable un effet stimulant de l'hypoxie et de l'hypercapnie chroniques sur la force contractile du myocarde.

- Ces résultats diffèrent des faits observés au cours des expérimentations d'hypoxie et d'hypercapnie aiguës où il a été démontré une augmentation des catécholamines circulantes (CHIONG 1972 , SORBINI 1976) responsables d'une augmentation du débit cardiaque et de l'inotropisme myocardique.
- En fait, dans la présente étude, les variations de l'indice de contractilité ne sont corollées qu'avec les variations de la fréquence cardiaque ($r = 0,708 ***$) répondant ainsi à un phénomène hémodynamique général.

Le mécanisme des effets hémodynamiques de l'inhalation $D'O_2$ 100 p cent sur la circulation systémique a suscité de nombreuses controverses depuis la constatation par PARKINSON en 1912 d'un ralentissement discret mais significatif de la fréquence cardiaque chez l'homme normal soumis à l'inhalation d'oxygène.

- La diminution de la fréquence cardiaque et du débit cardiaque est attribuée par DRIPPS et COMROE 1947 à un réflexe vagal engendré par la pression d'oxygène accrue sur les chemorécepteurs. Néanmoins actuellement, il est communément admis que l'hyperoxie a peu d'effet sur les chémorécepteurs : le potentiel d'action des nerfs du corpuscule carotidien ne montre pas d'activité des chémorécepteurs lorsque la saturation artérielle en oxygène dépasse 97% (VON EULER 1939) ou lorsque la PO_2 artérielle dépasse 110 mmHg (WITZLEB 1955).
- La diminution de la fréquence cardiaque et du débit cardiaque, l'augmentation de la pression, des résistances systémiques et du travail systolique ventriculaire gauche ressemblent aux effets cardiovasculaires de certains vasoconstricteurs (EGGERS 1962).
- L'effet vasoconstricteur périphérique de l'oxygène pourrait être une réponse localisée de la paroi vasculaire à l'augmentation de la PO_2 des tissus environnants. Cet effet vasoconstricteur accompagné d'une diminution du débit régional a été constaté sous inhalation d'oxygène au niveau de la rétine, du cerveau et du rein (DOLLERY 1964, KETY 1948, ABER 1964).

- L'effet vasoconstricteur périphérique pourrait être également le résultat global d'une stimulation centrale du système neurosympathique par augmentation de la PCO_2 du système nerveux central. (TENNEY 1956, PRICE 1960 cités par EGGERS).

- D'autre part .EKENDORFF(1947) , SOBOL (1962) ont montré que le débit coronarien est significativement diminué chez le chien pendant l'administration de l'oxygène 100 p cent. BOURASSA (1969) constate chez les patients atteints de coronaropathie soumis à l'inhalation d' O_2 100 p cent une diminution du débit coronarien qui pourrait être expliquée par une vasoconstriction coronarienne.

- Ainsi le déroulement des effets de l'oxygène 100 p cent pourrait être le suivant :

- Effet vasoconstricteur périphérique

responsable d'une augmentation de la pression systémique et d'un ralentissement de la fréquence cardiaque par un réflexe sinocarotidien. Le ralentissement circulatoire expliquerait la diminution du débit cardiaque.

- Sur le plan hémodynamique ventriculaire gauche

L'augmentation discrète de la PVG_{td} pourrait s'expliquer par l'effet STARLING en réponse à l'augmentation des résistances périphériques et du travail systolique (réaction superposable, à un moindre degré, à celle observée après méthoxamine.) et par une diminution de la compliance ventriculaire gauche relative à la vasoconstriction coronarienne et à la diminution du débit coronarien.

- La diminution de l'indice de contractilité pourrait relever du ralentissement circulatoire général et de la fréquence cardiaque en particulier (corrélation très significative entre $\Delta dp/dt / PI$ et ΔFC) mais également de la vasoconstriction coronarienne.

- On ne peut cependant exclure un effet direct de l'oxygène sur le myocarde et une inhibition des récepteurs béta adrenergiques en particulier.

Quel que soit le mécanisme invoqué, l'inhalation d'oxygène 100 p cent apparaît responsable d'un ralentissement circulatoire modéré et d'un effet dépresseur discret sur la fonction ventriculaire gauche.

L'hypothèse de travail était de déterminer dans quelle mesure l'effet dépresseur de l'oxygène pouvait être un élément révélateur d'une dysfonction ventriculaire gauche chez les patients atteints de BPCO.

L'incidence de l'hypoxie et de l'hypercapnie basales étant éliminée, nous avons comparé les réactions à l'oxygène observées chez 10 patients ayant présenté des antécédents de décompensation droite et dont la condition respiratoire et hémodynamique pulmonaire demeuraient sévères (Groupe I), à celles recueillies chez 8 sujets moins sévèrement atteints et indemnes d'antécédents d'insuffisance cardiaque (groupe II). L'âge des deux groupes est sensiblement identique.

- La PCP et la PVGtd sont significativement plus élevées (*) dans le Groupe I que dans le Groupe II. L'indice de contractilité $dp/dt/PI$ est légèrement plus faible chez les sujets du Groupe I mais n'est pas discriminant.

- Les pentes de fonction ventriculaire gauche Wsystolique $VG = f(PVGtd)$ établies pour les deux groupes entre les valeurs observées en air ambiant et celles recueillies sous oxygène font apparaître une différence sensible : la pente des sujets du Groupe I (antécédents d'IVD) est nettement moins abrupte que celle du Groupe II suggérant chez les premiers l'apparition d'un trouble de la compliance ventriculaire gauche sous l'effet de l'inhalation d'oxygène. (diagramme page 170)

Ainsi chez les sujets les plus sévèrement atteints et comportant des antécédents d' IVD semble-t-il exister une "susceptibilité " ventriculaire gauche particulière dont la nature est imprécise mais qui pourrait être consécutive à une détérioration progressive engendrée par les à coups hypoxiques, acidotiques, les poussées itératives d'insuffisance cardiaque, et probablement aussi par des facteurs individuels inhérents à l'âge et au terrain.

- Une telle hypothèse semble corroborée par les constatations de JEZEK et SCHRIJEN (1973) : chez les patients en état d'insuffisance cardiaque droite , la perfusion d'angiotensine s'accompagne d'une élévation du travail systolique et d'un accroissement anormal de la PVGtd. Chez les patients indemnes d'insuffisance cardiaque la réaction à l'angiotensine est normale : élévation minime de la PVGtd pour une nette augmentation du travail systolique.

Dans un deuxième travail, ces mêmes auteurs (JEZEK et SCHRIJEN (1975) grâce aux mesures cinéangiographiques des volumes ventriculaires gauches mettent en évidence chez les patients en état d'insuffisance cardiaque droite une augmentation des volumes télédiastolique et télésystolique ainsi qu'une diminution de la fraction d'éjection et de la compliance ventriculaire.

La fonction ventriculaire gauche des sujets indemnes d'insuffisance cardiaque droite est comparable à celle des sujets normaux.

De tels faits soulignent le caractère souvent inapparent de la dysfonction du ventricule gauche chez les patients atteints de BPCO sévère indemnes d'insuffisance cardiaque droite, et la nécessité de recourir à une méthodologie complexe pour la révéler.

La prépondérance des troubles de la compliance ventriculaire gauche et l'absence d'un déficit patent de la contractilité laisse supposer la réversibilité de telles anomalies à la faveur de la correction de l'insuffisance respiratoire.

Les anomalies potentielles de la fonction ventriculaire gauche observées au cours des BPCO sévères justifient le maintien de la thérapeutique digitalo-diurétique après régression des poussées d'insuffisance cardiaque.

T A B L E A U A

Effet de l'inhalation d'O₂ 100 pour cent, sur quelques paramètres respiratoires et hémodynamiques.

Relevé de la littérature.

Symboles ↑ augmentation significative
 ↓ diminution significative
 ↗ augmentation non significative
 ↘ diminution non significative
 → sans modification

Les références de WESTCOTT à WILSON, d'après AVIADO D.M.
the lung circulation - vol II
Pergamon Press édit. London 1965 P. 1137

/NORMAUX /	° V	° VA	H ⁺	PaCO2	PCP	PAP	PAos	PAoD	PAo	FC	IC	IS	W syst. VG	RAP	RAS	PVGS	PVGtd	OP/dt/Pri
1963 COTES	→								↑	→	→	→			→			
1970 VALE	↑		↓	↓														
1971 KARETZKY	↑	↑	↓	↓					↑	→	→	→			↑			
1958 BARRATT- BOYES						↓			↑	→	→	→		↓	↑			
1943 KEYS	↑								↑		→							
1946 WHITEHORN								↑	↑	→	→	→						
1946 OTIS	↑								↑	→	→	→						
1947 DRIPPS	↑										→							
1962 DALY									↑	→	→	→			↑			
1962 EGGERS			↑					↑	↑	→	→	→			↑			
1948 ALVERYD	↑		↑	↑			↑	↑	↑	→	→	→			↑			
1969 BOURASSA									↑		→		→		↑			
/ BPCO /																		
1968 HORSFIELD	↓			↑		↑			↑	→	→	→						
1951 WESTCOTT									↑	→	→	→						
1951 DEXTER											←			→				
1952 MOUNSEY						→					←							
1952 STORSTEIN						→			↑		→			→				
1955 WILSON						→					→			→				
1958 TOURNAIRE (thèse FAUCON)	↓	↓	↑	↑		↖			↖	↖	↖	↖		↑				
Présente Etude 18 cas	↓	↓	↑	↑	↑	↖	↖	↖	↖	↖	↖	↖	↑	↖	↖	↖	↖	→

C O N C L U S I O N S /

Dix huit patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), dont l'âge moyen est de 64 ans, sont soumis à une étude hémodynamique des cavités droites, de la circulation pulmonaire, des cavités gauches du coeur et de l'aorte, à l'état basal (n = 18) , au cours de l'effort(n=10), et pendant une inhalation d'oxygène 100 p cent (n = 18) .

Le stade évolutif est variable : coeur pulmonaire confirmé avec antécédents d' IVD (10 cas), coeur pulmonaire au stade initial (6 cas), BPCO indemnes de retentissement sur la circulation pulmonaire et le coeur droit (2 cas).

L'évaluation fonctionnelle du ventricule gauche repose sur l'index cardiaque, l'index systolique, le travail systolique externe du VG, la pression ventriculaire gauche télédiastolique, la vitesse de montée de pression isovolumétrique (dp/dt) et l'index de contractilité $dp/dt/PI$ max (PI = pression isovolumétrique correspondant à dp/dt max).

Les différents paramètres ressortissant à l'hémodynamique métabolique et à l'hémodynamique pressionnelle droite et gauche, sont confrontés aux données recueillies chez 14 sujets normaux d'âge identique, ou à des valeurs théoriques tenant compte de l'âge et du débit cardiaque.

A des degrés divers, les différences observées portent essentiellement sur la présence de troubles gazométriques témoignant d'une hypoventilation alvéolaire, et d'une hypertension artérielle pulmonaire précapillaire, indépendante de l'hémodynamique du coeur gauche.

La fonction ventriculaire gauche apparaît normale, sauf chez un seul patient dont les indices de compliance et de contractilité sont manifestement altérés. La fonction ventriculaire gauche demeure néanmoins indépendante des désordres gazométriques et des modifications des pressions artérielles pulmonaires.

Huit patients comportant des facteurs de risque d'affections cardio-vasculaires systémiques (diabète, coronaropathie, hypertension systémique discrète) ont une fonction ventriculaire gauche superposable à celle observée chez les autres patients indemnes d'un tel risque.


DIX patients affectés d'antécédents d'IVD comparés à huit sujets n'ayant jamais présenté de décompensation cardiaque, n'offrent aucune différence sensible en ce qui concerne la PCP, la PVGtd et l'indice $dp/dt / PI$.

Ainsi ni les facteurs de risque vasculaire ni les antécédents de décompensation cardiaque ne permettent d'authentifier à l'état basal, et en dehors de toute insuffisance cardiorespiratoire, une anomalie fonctionnelle du ventricule gauche.

L'épreuve d'effort détecte chez 10 patients, 3 cas de dysfonction ventriculaire gauche; chez 2 d'entre eux, une pathologie ventriculaire gauche autonome, indépendante de l'affection respiratoire, peut être suspectée (hypertension systémique coronaropathie).

L'inhalation d'oxygène 100 p cent engendre une baisse de la pression artérielle pulmonaire dans la mesure où apparaît une diminution de la fréquence cardiaque. L'abaissement de la pression artérielle pulmonaire est plus sensible lorsque la désaturation oxyhémoglobinée est initialement plus marquée, mais demeure indifférent aux variations de l'hypercapnie.

En outre, l'inhalation d'oxygène 100 p cent est responsable d'une augmentation discrète des pressions aortiques et du



travail systolique externe du ventricule gauche; parallèlement apparaît un effet dépresseur sur la fonction ventriculaire gauche : élévation significative de la pression télédiastolique et abaissement de l'indice de contractilité. Cet effet dépresseur est significativement plus marqué chez les sujets parvenus au stade de coeur pulmonaire confirmé et ayant des antécédents d'insuffisance ventriculaire droite.

EN RESUME, à l'état basal et à distance de tout épisode de décompensation cardiaque, l'altération de la fonction ventriculaire gauche des patients atteints de BPCO apparaît peu commune, et essentiellement fortuite (1 cas sur 18). Cependant, chez les sujets les plus sévèrement atteints et comportant des antécédents d' IVD, il semble exister une " susceptibilité " ventriculaire gauche particulière, qui pourrait expliquer les anomalies de la fonction ventriculaire gauche constatées par certains auteurs, uniquement, au cours des poussées de décompensation cardiaques.

De tels faits soulignent le caractère souvent inapparent de la dysfonction du ventricule gauche chez les patients atteints de BPCO sévère , indemnes d'insuffisance cardiaque droite, et la nécessité de recourir à une méthodologie complexe pour la révéler.

La prépondérance des troubles de la compliance ventriculaire gauche et l'absence d'un déficit patent de la contractilité laisse supposer la réversibilité de tels anomalies à la faveur de la correction de l'insuffisance respiratoire.

Les anomalies potentielles de la fonction ventriculaire gauche observées au cours des BPCO sévères justifient le maintien de la thérapeutique digitalo-diurétique après régression des poussées d'insuffisance cardiaque.

Le Président de la THESE

Pr. GONIN

Vu, le Directeur de l' U.E.R.
SUD-OUEST

Pr. NORMAND

Vu et Permis d'Imprimer

LYON, le 20 JANVIER 1977

Le Président de l' Université Claude Bernard
Président du Comité de Coordination des
Etudes Médicales.

D. GERMAIN

- ALTSCHULE M.D. Cor pulmonale : A disease of the whole heart
Dis Chest 41 : 398-403 1962
- ALTSCHULER ST Med. clin. Northam 57 351-61 Juillet 73
(biblio : 40)
Oxygen therapy in pulmonary disease oxygen us
and toxicity.
- AMTORP O UGESKR Laeger 135 743-5 23 avril 73 (DK)
Acute pulmonary edema in patients with chronic
pulmonary disease and right sided heart failure
- ASHLEY WN Am Heart J 90 (4) 463-7 oct 75
Pulmonary arterial oxygen saturation during
treadmill exercise. A discriminative index of
functional class.
vol 17 n° 1 Jan 76
- ASMUSSEN E et CHIODI H The effect of hypoxemia on ventilation and cir-
culation in man;
Am J Physiol 1941 132 426-436
- ABER et coll. The effects of acute changes in inspired oxygen
concentration on cardiac, respiratory and renal
function in patients with chronic obstructive
airways disease
Clin. Sc: 26 : 133, 1964
- ADDIS G.J. Effect of "100 %" oxygen breathing on mixed
venous oxygen pressures
Scot. Med.J. 10 : 215-217

- BAHLER RC. et coll. Assessment of left ventricular function in
chronic obstructive pulmonary disease
Chest 1975 68 132-133
- BALDWIN E.F. et coll. Pulmonary insufficiency
Physiological classification clinical methods
of analysis standard values in normal subjects
Medicine 1948 27 243-278
- BANUS M.G. et coll. The sensitivity of the respiratory center to
hydrogen ion concentration
Am J Physiol 1944 142 121-130
- BARACH et coll. Chest 66 112-3 Août 74
Hypercapnia in chronic obstructive lung disease
an adaptive response to low flow oxygen therapy
- BAUM GL. et coll. Left ventricular function in chronic obstructive
lung disease
New Engl J Med 1971 285 361-365
- BAUMAN. DJ et coll. Am J Med Sci 265 281-5 An.73
Decreased oxygen consumption in cardiac
patients with severe reduction in cardiac
output Sept 73
- BEAN J.W. Effects of oxygen at increased pressure
Physiol Rev 1945 25 1-147
- BEMIS CH.E. et coll. Influence of right ventricular filling
pressure on left ventricular pressure and
dimension Circulat Res 1974 34 498-504

- BENZA GC. et coll. Simultaneous right and left heart catheterization and transmural pressure in chronic obstructive lung disease. In : Progress in Respiration Research vol. 9 : Pulmonary hypertension J. Widimsky ed., Karger, Basel, 1975, pp. 55-62
- BERGOFISKY E.M. et coll. Am J Med USA 1974 57 n° 3 378-394
Mechanisms underlying vasomotor regulation of regional pulmonary blood flow in normal and diseases states
- BERNARD R. et coll. Bull Who 49 155-65 1973
Correlations between ECG and pulmonary arterial pressure in chronic pneumopathies
- BESSE P. BRICAUD H. Moyens d'étude de la performance cardiaque chez l'homme
Revue Prat. 5 VII 1972 XXII 19 20 21
pp 2911-2957
- BESSE P. et coll. Les propriétés mécaniques et contractiles du myocarde humain
Arch mal du coeur 1971 64 461
- BHARGAVA RK. et coll. Relationships between ischemic heart disease and chronic diffuse pulmonary disease
Chest 1971 59 254-261
- BINET L. et coll. Modifications de l'électrocardiogramme au cours de l'anoxémie aigüe chez le chien
C.R. Soc Biol 1937 125 318
- BJURSTEDT H.A.G. Interaction of centrogenic and chemoreflex control of breathing during oxygen deficiency at rest Acta physiol scandinav 1946 12 suppl 38 1-88

- BOURRET Thèse Lyon 1972
-
- BARRATT-BOYES Cardiac output and related measurements and pressure
B.G. et coll. valves in the right heart and associated vessels,
together with an analysis of the hemodynamic response
to the inhalation of high oxygen mixtures in healthy
subjects. J.Lab. Clin. Med. 51 : 72-90
-
- BARRATT-BOYES The oxygen saturation of blood in the venae cavae,
et coll. right-heart chambers, and pulmonary vessels of
healthy subjects. J.Lab. Clin. Med. 50:93-106
-
- BENEDICT Effects on men at rest of breathing oxygen-rich gas
et coll. mixtures Am. J. Physiol 28 : 1-28
-
- BOURASSA (M.G.) The effects of inhalation of 100 p cent oxygen on
et coll. myocardial lactate metabolism in coronary heart
disease
Am J. Cardiol 1969, 24: 172-177
-
- BATEMAN IR Effets de l'hypercapnie chronique sur le pH intra-
CAMERON cellulaire et les electrolytes du myocarde chez le
rat hypoxique chronique
Bull. Europ. Physiopathologie Resp.
1976 - 12 227 - 228

- COLTON CK
et coll. J Appl physiol 35 307-9 Août 73
Mechanism of oxygen transport augmentation by
hemoglobin.
Nov. 73
- COMROE J.H.
et coll. The Lung Clinical physiology and pulmonary fonction tests.
1 vol 390 p. Chicago 1962 Year Book Pub éd.
- COTES J.E.
et coll. Effect of breathing oxygen upon cardiac output,
heart rate, ventilation, systemic and pulmonary
blood pressure in patients with chronic lung
disease.
Clinical Science 1963 - 305 - 321
- THE CRITERIA COMMITTEE of th New York Heart Association Nomenclature and
Criteria for Diagnosis of the Heart and Great
Vessels.
Ed. 7 Boston 1973, Little, Brown and Co.
- CROONEN F.
et coll. Ergonomics 17 113-7 Jan 74
Oxygen uptake calculated from expiration volume
and oxygen analysis only.
- CROSBIE WA.
et coll. QJ Med 43 215-30 Avril 74
Cardiopulmonary function of congested lungs.
- CUNNINGHAM D.J.C.
et LLOYD B.B. The regulation of Human Respiration
1 vol 591 p. Oxford 1963 Blackwell éd.
- CHIONG (H.A.) et coll. The sympatho adrenal system in the cardiac
vascular responses to hypoxia in the dog
Canad.J. Physiol. Pharmacol.
1972, 50, 674 - 683

- DALY WJ
et coll. Effects of oxygen breathing on the heart rate
blood pressure, and cardiac index of normal men
resting, with reactive hyperemia and after atropine.
Clin. Invest. 1961 - 41 - 126.
- DAMSGAARD T.
et coll. Acta med Scand Suède (974 196 n° 1-2 103-108
Prognosis in severe chronic obstructive pulmonary disease.
- DASKALOV TR.
et coll. Vutr Boles 11 (5) 38-45 1972
Phase analysis of the left heart ventricle in
loading of the right heart caused by chronic
non specific diseases of the lung.
- DASKALOV TR.
et coll. Vutr Boles 13 (1) 39-45 1974
Significance of chronic hypoxia hypercapnia and
acidosis in the incidence of pulmonary hypertension in patients with chronic non specific
lung disease.
- DAUM S.
et coll. Oxygen therapy in chronic cor pulmonale
Verh Dtsch Ges Inn Med 81 : 499-500 1975
- DAVIES H. et
OVERY HR. Chest 1970 58 8.14
Left ventricular function in cor pulmonale
- DEAN T. et
MASON MD. Regulation of cardiac performance in Clinical
Heart disease
Interactions between contractile state.
Mechanical abnormalities and ventricular compensatory mechanism.
Am J Cardiol 1973 XXXII 437-449

- DEJOURS P.
et coll. Stimulus oxygène de la ventilation au repos et
au cours de l'exercice musculaire à basse alti-
tude (50 m) chez l'homme.
Rev. Franç. études clin. et biol. 1958 3 105-123
- DENOLIN H. Le coeur pulmonaire chronique en médecine interne.
Verh Deut Ges Kreislaufforsch 21 217 1955
- DENOLIN H.
et coll. ASPECTS PHYSIOPATHOLOGIQUES de la circulation
pulmonaire. Le problème de l'Hypertension pulmo-
naire chronique.
Acta Clin. Belg. 8 647 1953
- DENOLIN H. and
LEQUIME J. Les modifications circulatoires dans le coeur
pulmonaire chronique.
Arch Mal Coeur 5 : 391-1951
- DENOLIN H. Le ventricule gauche dans les bronchopneumopa-
thies chroniques obstructives.
Bull. Euro. physiopath. respir.
1976, XII, N° 3, 407-413
- DEVITSKIJ BS.
et coll. Kardiologiya SSSR 15 N° 6 88-93
Signes ECG précoces du CPC
- DEXTER L.
et coll. The effect of chronic pulmonary disease
(cor pulmonale and hypoxia) on the dynamics of
the circulation in man
Trans Assoc Am Physicians 64 : 226-236 1951

- DOLINSKY A.
et coll. Cas. Lek Cesk 112 105-8 Jan 73
Changes of the cardiac volume in chronic obstructive pulmonary disease during respiratory and cardiac failure.
- DOWNING SE.
et coll. Influence of hypoxemia et acidemia on left ventricular function.
Am J Physiol 210 : 1327 1966
- DRIPPS-COMROE The effect of the inhalation of high and low oxygen concentrations on respiration, pulse rate, ballistocardiogram and arterial oxygen saturation (oximeter) of normal individuals
Am. J. Physiol. 149:277-291
- DOLLERY et coll. High oxygen pressure and the intinal blood vessels. Lancet, 2 : 291, 1964

- EDELMAN NH et coll. Prev med 2 (1) 34-42 Mars 73
Early detection of chronic pulmonary disease
- EDWARDS C.W. et coll. Thorax 1974 29 75-80
Left ventricular hypertrophy in emphysema
- ENSON Y. et coll. Trans Assoc Am Physicians 88 248-55 1975
Pulmonary hypertension in interstitial
lung disease : relation of vascular resistance
to abnormal lung structure
- ETSYON J. et coll. Estimation of cardiac output from respiratory
data p 237 260 in :
Inbar GF. ed. Signal Analysis and pattern
recognition in biomedical engineering
New York Willey 1975 QT 34 1685 S 1974
- EGGERS, G.W. et coll. Hemodynamic responses to oxygen breathing
in man J. Appl. Physiol. 17 : 75-79
- ECKENHOFF J.E.
et coll. Cardiac oxygen metabolism and control of the
coronary circulation Am. J. Physiol.
149 : 634, 1947
- VON EULER (V.S.)
et coll. The excitation mechanisms of the chemoreceptors
of the carotid body
Scand Arch Physiol.
1939, 83, 132

- FAUCON M. L'inhalation d'oxygène chez les emphysémateux
au stade du coeur pulmonaire chronique
Thèse Lyon 1958
- FELIX R. et coll. Entwicklungsstadien die Insuffizienz und
die Differentialdiagnose des cor pulmonale
aus röntgendiagnostischer Sicht
Bull sign CNRS 1975 n° 9
- FERRER M.F. et coll. Am Heart J 1975 89 n° 5 657-664
Cor pulmonale present day status
- FERRER MI Disturbances in the circulation in patients
with car pulmonale
Bull NY Acad Med 41 : 942-958 1965
- FISHMAN AP. Cor pulmonale
Hosp Practice May 1971 pp 101-117
- FISHMAN A.P. et coll. The left ventricle in chronic bronchitis and
emphysema
New England J Med 1971 285 402-404
- FLANDROIS R. et coll. CRSOC Biol Paris 167 (1) 54-7 1973
Vol 16 n° 6 Juin 75
Influence of the rapidity of alveolar PO_2
increase on the ventilation response
- FLUCK D.C. et coll. Left ventricular hypertrophy in chronic
bronchitis
Br Heart J 28 : 92-97 1966
- FORSTER R.E. Exchange of gases between alveolar air and
pulmonary capillary blood : pulmonary diffusing
capacity Physiol Rev 1957 37 391-452

- FRANK MJ and
LEVINSON GE. An index of the contractile state of the
myocardium in man
J Clin Invest 47 : 1615 1968
- FRANK MJ.WEISSE AB.
et coll. Left ventricular coronary flow, metabolism
and performance in chronic cor pulmonale
Circulation 38 (suppl 6) : 78 1968
- FRANK M.J. et coll. Left ventricular function metabolism and
blood flow in chronic cor pulmonale
Circulation 1973 47 798 806
- FUMAGALLI G. et coll. Minerva Med 65 (92) 4899-903 22 Dec 74
Effects of oxygen therapy on the hematocrit
value in hypoxemic chronic bronchopneumopathie

- GAULT JH.
et coll. Contractile state of the left ventricle in man :
instantaneous tension velocity length relations
in patients with and without disease of the left
ventricular myocardium.
Cir Resp 22 : 451-463 1968
- GLEASON W.L.
et coll. Studies on the first derivative of the ventricu-
lar pressure pulse
J Clin Invest 1962 41 80
- GONZALES SANTOS P. Rev Clin Esp 129 15-26 1er avril 1973
Cor pulmonale ECG changes and their correlation
with respiratory function test data
- GOTTSEGEN G. et
TOROK E. A clinicopathologic study of cor pulmonale with
heart failure
Amer J Cardiol 2 : 441 1958

- HALDANE J.S. et
PRIESTLEY J.G. Respiration (1 vol 493 p. Londres 1935)
Oxford univ Press éd
- HAMBURGER J. et
coll. Techniques de réanimation médicale et de contro-
le de l'équilibre humoral en médecine d'urgence.
3e éd 1 vol 470 p Paris 1960 Ed Méd Flammarion
- HARVEY RM
et coll. Cardiac output in Cor Pulmonale
Arch. Kreisl. Forsch 1965 T1 46-47
- HARVEY R.M.
et coll. Influence of chronic pulmonary disease on the
heart and circulation
Am J Med 10 : 719 1951
- HASSELBACH K.A. Neutralitätsregulation und Reizbarkeit des
Atemzentrums in ihren Wirkungen auf die
Kohlensäurespannung des Blutes.
- HERCUS V.M.
et coll. Sodium exchanges in cardiac muscle
J Physiol 1955 129 177-183
- HERLES F.
et coll. Site of pulmonary resistance in cor pulmonale
in chronic bronchitis
Br Heart J 30 : 654-660 1968
- HIRAKAWA S.
et coll. Jpn Circ J. 40 (1) 35-51 jan 76
Non Invasive assessment of the performance of
the right heart during dynamic exercise; a study
of the left sided heart disease.
- HORSFIELD
et coll. The pulmonary circulation in chronic bronchitis
at rest and during exercise, breathing air and
80 % oxygen
Clin. Science 1968 - T 34 - 473

- HUCKAUF H.
et coll. Pneumologie (D) 1974 150 n° 2-4 271-275
Ein Beitrag zum Verhalten der Sauerstoffaffinität
des Hämoglobins bei Patienten mit Chronisch
Obstruktiven Lungenerkrankungen.
- HUGENHOLTZ P.G.
et coll. Myocardial force velocity relationships in cli-
nical heart disease
Circulation 1970 41 191
- HUNTER PJ.
et coll. J physiol (Lond) 241 (2) 87-88 sept 74
Development of a mathematical model of the left
ventricle.
- HUTCHISON D.C.
et coll. Indian Heart J 27 (4) 260-73 Oct 75
Circulatory Studies in respiratory failure due to
acute exacerbations of chronic obstructive airway
disease and the effects of breathing 35 % Oxygen

- JAEGER M et RIVIER JL Hypertension pulmonaire vasculaire acquise
Correlations hémodynamiques et ECG
Arch Mal Coeur 1972
- JEZEK V.SCHRIJEN F. Left ventricular function in chronic
obstructive pulmonary disease with and
without cardiac failure
Clin Sci Med 1973 45 267-279
- JEZEK V.SCHRIJEN F. Left ventricular function in chronic
bronchitis
Progress in respiration research vol 9 :
pulmonary hypertension
J Widinsky ed Karger Basel 1975 49-54

- KATSAROS B. et coll. Wirkung der Bicarbonat-Alkalose auf die Lungenbelüftung beim Menschen. Bestimmung der Teilwirkungen von pH und CO_2 - Druck auf die Ventilation und Vergleich mit den Ergebnissen bei Acidose
Pflügers Arch ges physiol 1960 271 732-747
- KATZ L.N. Analysis of several factors regulating the permormance of the heart
Physiol Rev 1955 35 91-106
- KAZEMI H. et coll. Bull Physiopathol Respir Nancy Jan-Feb 74
10 (2) 267-72
Pulmonary vascular response to unilateral alveolar hypoxia : role of H^+
- KELLY D.T. Left ventricular fonction in acute RV hypertension suppl. III
Circulation vol XIII OCTOBRE 1970 (642)
- KELLY D.T.:Spotnitz et coll. Effect of chronic right ventricular volume and pressure loading on left ventricular performance
Circulation 44 : 403 - 409 (1971)
- KHAJA F, and PARKER J.O. Right and left ventricular performance in chronic obstructive lung disease
Am HEART J. 82 : 319, 1971
- KHAJA F. PARKER JO. Rightand left ventricular performance in chronic obstructive lung disease
Amer Heart J. 1971 82 319-327

- KIGER JP et coll. Exercise function tests in pneumology
Poumon coeur 30 (6) 395-401 1974
- KITCHIN et coll. The effects of exercise and of breathing
oxygen-enriched air on the pulmonary
circulation in emphysema
Clin. Science - 1961 - T 21 - 93
- KOK-JENSEN A. et coll. Scand J. resp Dis Denn 1974 55 n°2 120-128
Prognosis in severe chronic obstructive
pulmonary disease-Relation to degree of
obstructive age and sex and ECG changes
suggesting cor pulmonale
- KOUNTZ WB ALEXANDER HL et coll. The heart in emphysema
Am Heart J 11 : 163 - 172, 1936
- KRALIOS AC. et coll. Myocardial oxygen consumption at constant
left ventricular workload and varying arterial
oxygenation
Cardiovasc Res 9 (6) 811-9 Nov 75
- KRONGRADE E. et coll. Jan 73 Mai 73
Effect of breathing oxygen in patients with
severe pulmonary vascular obstructive disease
circulation 47 94-100

- LOBACH EM.YA. Vrach Delo USSR 1974 n° 5 29-31
- ZHIVOTKOVSKAYA I.A. Importance de l'hypoxémie et de l'hypercapnie
dans le développement du coeur pulm. chez les
malades atteints de pneumonie chronique
- LOCKHART A. Fonction du ventricule gauche dans la bronchite
chronique.
Bull. Physio-path. Resp. 8 : 1448-1455 (1972)
- LOCKHART A.
et coll. Elevated pulmonary artery pressure at rest and
during exercise in chronic bronchitis :
Fact or fancy.
Clin Sci 37 : 503-517, 1969.
- LOESCHCKE H.H. Differenzierung der Wirkungen von CO₂-Druck und
Wasserstoffionenkonzentration im Blut auf die
atmung beim Menschen
Pflüger's Arch ges Physiol 1960 270 461-466
- LUPI H.
et coll. Indices y mediciones radiologicas en la valora-
cion de la hipertension arterial pulmonar.
Inst. Cardiol Mexico 1975 45 n° 1 34-42

- MASON D.T. et coll. Usefulness and limitations of the rate of rise of intraventricular pressure (dp/dt) in the evaluation of myocardial contractility in man
Am of cardiology 1969 - 23 - 516
- MASON D.T. et coll. Time to peak dp/dt a useful measurement evaluating the contractile state of the human heart circulation 1965 32 (suppl.II)183
- MASON D.T.et coll. Regulation of cardiac performance in clinical heart disease
Amer J. Cardiol 1973 32 437-448
- MATTHAY RA.STEELE
PP. ELLIS JH. Effect of Dextran loading on left ventricular performance in severe chronic airway obstruction
Am Rev resp Dis 1975 111 893-894
- MCKEE PA et coll. The natural history of congestive heart failure : the Framingham Study
N Engl Med 285 : 1441 - 1146 - 1971
- MEERSON FZ et coll. Kardiologica 15 (7) 70-8 Jul 75
Contractile function and the effectweness of oxygen utilization by the heart during adaptation to hypoxia
- MICHELSON.N Bilateral ventricular hypertrophy due to chronic pulmonary disease.
Dis. Chest 38 : 435 - 446 (1960)

- MILLARD FJC The electrocardiogram in chronic lung disease.
Br Heart J 29 : 43-50 1967
- MIRSKY I et coll. Assessment of myocardial contractility in Children and young adults from ventricular pressure recordings
Am J. Cardiol 1971 27 359
- MITCHELL G.A. Cardiovascular innervation
1 vol 356p Edimbourg
1956 Livingstone éd
- MITHOEFER et coll. Response of the arterial PO_2 to oxygen Administration in chronic Pulmonary Disease
Ann. Intern. Med - 1971 - T 74 - 328 - 335
- MORET PR. BOPP P. et coll. Circulation coronaire et métabolisme du myocarde dans le coeur pulmonaire chronique
Cardiologia 1966 49 180-182
- MORET P.R. et coll. Recent Adv Stud Cardiac Struct Metab 2
559-66 1973
Cardiomyopathy and hypoxia
- MORGAN D.B. et coll. J. Sports Med Phys Fitness 16 (1) 38-44 Mar 76
The relation between heart rate and oxygen consumption during exercise
- MORPURGO et coll. M.G. Ital Cardio 5 (5) 617-22 1975
Chronic cor pulmonale Anatomical on functional entity ?

- MURPHY ML. ADAMSON J
et coll. Left ventricular hypertrophy in patients
with chronic bronchitis and emphysema
Ann intern Med 1974. 81 307-313
- MURPHY ML. et coll. Chest 65 622-7 Juin 74
The electrocardiographic diagnosis of right
ventricular hypertrophy in chronic
obstructive pulmonary disease

- NEILL W.D. Effects of arterial hypoxemia and hyperoxia on
oxygen availability for myocardial metabolism :
Patients with and without coronary heart disease.
Am J. Cardiol 24 : 166, 1969
- NEJAD N.S. Assessment of myocardial contractility from cen-
et coll. tricular recordings.
Cardiovasc Res 1971 5 15

- OBERFIELD
et coll. Change in $(A - a) PO_2$ as a function of $FI O_2$ at a
 constant $P I O_2$ in normal men
 J. appli. physiol. - 1971 - T 31 - 581 - 585
- OLINIC L.
et coll. Rev Med Intern 27 (2) 121-7 Mar-Aps 75
 Hypoxemia and hypercapnia in the development of
 chronic cor pulmonale
- OTIS A.B. Physiological adaptation to the chronic hypoxia
 associated with right to left shunts of the cir-
 culation. A comparison with the hypoxia of high
 altitudes
 XXXIe Congrès Internat Physiol Buenos-Aires
 1959 14-16

PAUL R.J.
et coll.

Am J Physiol 228 (3) 915-22 mars 75

Relation between length isometric force and O_2
consumption rate in vascular smooth muscle.

QUIRET J.C.
et coll.
(CHU Amiens)

Lille med Fr 1974 19 n° 6 661-669
Dépistage de l'hypertension artérielle pulmonaire
précoce dans les insuffisances respiratoires obs-
tructives.

- RABINOWITZ
et coll. Evidence for pulmonary venous obstruction in
pulmonary emphysema
J. Labor. and clin. Med. 1962 - T 60 - 1006
- RAHLF G.
et coll. Virchows Arch A. (D) 1975 366 n° 3 237-247
Der Linke Ventrikel bei chronischen cor pulmonale
- RAO B.S. Left ventricular failure secondary to chronic
pulmonary disease.
Am J Med 45 : 229 - 241, 1968
- REES H.A. The recognition of coronary heart disease in the
presence of pulmonary disease.
Brit Heart J 26-233, 1964
- REICHEL G.
et coll. Left heart in cor pulmonale
Prax Pneumol 28 Suppl : 1082-7, Dec 74
- RICE D.L.
et coll. Chest 66 (6) 628-32 Dec 74
Wedge pressure measurement in obstructive
pulmonary disease
- RICHARDS D.W. Circulatory effects of hyperventilation and
hypoventilation
In Handbook of Physiolog. Section 2 circulation,
vol 3 edited by HAMILTON W.F., Dow P,
Washington DC American Physiological Society
1965 pp. 1887 - 1897

- ROGEL S
et coll. Arch Int Physiol Biochim 83 (4) 789-97 Oct 75
Coronary venous flow and O₂ saturation during
transitional phases between various cardiac rates.
- ROTHSCHUH K.E. Entwicklungsgeschichte physiologischer Probleme in
Tabellen-form
1 vol 122 p München 1952 Urban éd
- RULLI R. Physiopathological concept of chronic cor pulmo-
nale.
Poumon coeur 32 (3) : 107-11, 1976
- RUSHMER R.F. Cardiovascular dynamics
1 vol Philadelphie et Londres 1961 Saunders éd.

- SADOUL P. et coll. Causes and prevention of pulmonary heart disease
Brux Med 52 767 78 Nov 72
- SAKLAD M et coll. Int Anesthesiol Clin 12 (3) 25-45 1974
Obtaining and interpreting respiratory flow pressure and volume waveforms
- SANTUCCI J. et coll. Bull Physiopathol Respir Nancy Jan-Fev 74
10 (2) 27-37
Non Steady state variations of PAO_2 following changes in alveolar ventilation
- SAPRU RP et coll. Comparison of the pulmonary wedge pressure with the left ventricular end-diastolic pressure in man.
Clin Sci 34 : 125 - 140 1968
- SARNOFF S.J. Myocardial contractility as described by ventricular function curves
Observations on Starling's law of the heart
Physiol Rev 1955 35 107-122
- SATBEKOL Zh. et coll. Ter Arkh 46 (5) 67-72 1974
Hemodynamics in patients with chronic obstructive disease of the lungs with arterial hypertension
Vol 15 n° 9 Sept 74
- SCHUREN K.P. et coll. Pneumologie (D) 1974 150 n° 2-4 291-297
Rhythmusstörungen bei chronischen cor pulmonale

- SCOTT E.W. and GARCIN DF Cor pulmonale : observations in 50
autopsy cases
Am. Heart J. 22 : 56-63 (1941)
- SEVERINGHAUS J.W. Oxyhemoglobin dissociation curve correction
for temperature and pH variation in human
blood
J. Appl Physiol 1958 12 485-486
- SEVERINGHAUS J.W. Accuracy of blood pH and P_{CO_2} determinations
et coll.
J Appl Physiol 1956 9 189-196
- SEVERINGHAUS J.W. Alveolar dead space as an index of distribution
et STUPFEL of blood flow in pulmonary capillaries J Appl
Physiol 1957 10 335-348
- SHAPIRO A. et coll. J. Sports Med Phys Fitness 16 (1) 57-9 Mar 76
Recovery heart rate after sub maximal work
- SHAW DB et coll. Pulmonary circulation in chronic bronchitis
and emphysema
Brit Heart J 27 : 674 1965
- SHEILA RAO B. et coll. Left ventricular failure secondary to chronic
pulmonary disease Am. Heart J. Of Med. 1968
T 45 229 - 241
- SHERTER CB. et coll. Chest 67 (3) 259-61 Mars 75
Prolonged rate of decay of arterial PO_2
following oxygen breathing in chronic
airways obstruction

- SIDERIS D.A. et coll. J. Electrocardiol 7 (4) 295-300 Oct 74
Some correlations between electrocardio-
graphic findings and lungs volumes in
pulmonary diseases
- SIEGEL J.H. et coll. The quantification of myocardial contractility
in dog and man
Cardiologia 1964 45 189
- SMITH J. Lorrain The pathological effects due to increase
of oxygen tension in the air breathed
J Physiol 1899 24 1 9-35
- SPAIN D.M and CHRONIC cor pulmonale, sixty cases studied
HANDLER B.J. at necropsy.
Arch. intern. Med. 77 : 37-65 (1946)
- STARLING E.H. et The regulation of the energy output of the heart
VISSCHER M.B. J Physiol 1927 62 243-261
- STEELE P.ELLIS JHJR Amer J Med U.S.A. 1975 n° 1 21-28
Left ventricular ejection fraction in severe
chronic obstructive airways disease
- STEIN P.D. et coll. Am J. Cardiol 37 (6) 871-7 May 76
Force Velocity lenght relations in man
expressed by a single hemodynamic expression
the ejection rate of change of power at
peak tension

STORSTEIN O.

The effect of pure oxygen breathing on the
circulation in anoxemia

Acta Med Scand 143 suppl 269 1952

SUSA Z et coll.

Hypertrophy of left ventricle in patients
with cor pulmonale chronicum

Cas Lek Cesk 114 (48) : 1492-5 28 Nov 75

- TARTULIER M. COEUR pulmonaire chronique et syndrome prémonitoire.
Thèse LYON 1950
- TAYLOR J.F.N. et coll. Effects of acidosis catechols and atrial function on pulmonary pressure gradients.
C.N.R.S. Bulletin Signaletique 352 1976 vol 37 n° 7-8
- TECULESCU D. et coll. Med Intern 26 221-36 fev 74
Pulmonary function in chronic bronchitis and emphysema.
- THOMAS A.J. Coronary heart disease in the presense of pulmonary disease.
Br Heart J 20 : 83-91, 1958
- TOURNIAIRE A. et coll. Syndrome prémonitoire du coeur pulmonaire chronique
49 Observations
Arch Mal Coeur 47 591 1954
- TURINO G.M. et coll. Water, electrolytes and acid-base relationships in chronic cor pulmonale.
Progr. Cardiovasc Dis 12 : 467-483, 1970

UNGER K.

Evaluation of left ventricular performance in

SHAW D. et coll.

acutely ill patientse with chronic obstructive
lung disease.

Chest 1975 68 135-142

VANDERMOTEN P.
et coll.

Fonction ventriculaire gauche dans le coeur pulmonaire chronique 1976

Laboratoire d'exploration Cardiopulmonaire

Hôpital St Pierre

rue Haute

BRUXELLES (BELGIQUE)

- WEISFELD M.L.
et coll. Am J. Physiol 227 3 613-21 Sept 74
Hemodynamic determinants of maximum negative
dp/dt and periods of diastole.
- WEISSE A.B.
et coll Am J Med 58 (1) 92-8 Jan 75
Hemodynamic effects of staged hematocrit réduction in patients with stable corpulmonale and severely elevated hematocrit levels.
- WEISSLER AM
et coll. Relationship between left ventricular ejection time, stroke volume, and heart rate in normal individuals and patients with cardiovascular disease.
Am Heart J 62 : 367, 1961
- WILBRANDT W.
Zum Wirkungsmechanismus der Herzglykoside
Schweiz med Wchnschr 1955 85 315-320
- WILLIAMS JF
et coll. Left ventricular function in patients with chronic obstructive pulmonary disease
J. Clin Invest 1968 47 1143-1153
- WILLIAMS J.F.
et coll. Left ventricular Function in Patients with chronic obstructive Pulmonary Disease
J. Clin. Invest. 1968 - T 47 - 1143
- WINTERSTEIN H.
Die Regulierung der Atmung durch das Blut
Pflüger's Arch ges Physiol 1911 138 167-184
- WHITHORN W.V.
et coll. The cardiovascular responses to the breathing of 100 per cent oxygen at normal barometric pressure
Amer. J. Physiol. 1946 - T 146 - 61

YAMAZAKI H. TSUSU T.
NAKAMURA Y

Left and right heart in chronic cor
pulmonale

Respir Circ (Tokyo) 23 (4) : 325-31 Apr 1975

YU, et coll.

Studies of pulmonary hypertension I.

Pulmonary circulatory dynamics in patients
with pulmonary emphysema at rest.

J. clin. Invest, 32, 130

ZHITS Mz et coll.

Voen Med Zh 5.67.68 Mai 72

Hemodynamic Indices in chronic pulmonary
heart disease in relation to age

ZUNTZ N.

Physiologie der Blutgase und des respira-
torischen Gaswechsels (in Handbuch der
Physiologie par L. HERMANN IV Leipzig
1882 Vogel éd 1-8

BARRATT-BOYES B.G., WOOD E.M.

Hémodynamic response of healthy subjects to
exercise in the supine position while breathing
oxygen

J Appl physiol 1957 - 11 - 129-

DEJOURS P. La régulation de la ventilation au cours de
l'exercice musculaire chez l'homme

J physiol (Paris) 1959 - 51 - 163

DEJOURS P.

FLANDROIS R.

TEILLAC A. LEFRANCOIS

Autonomie des stimuli ventilatoires, oxygène,
gaz carbonique et neurogéniques de l'exercice
musculaire

J physiol (Paris) 1961 53 321

FOEX P. et coll

Le lavage du CO₂ myocardique: un facteur
d'augmentation de la performance cardiaque en cas
d'hypoxie

Bull. Europ Physiopathologie Resp

1976 - 12 - 231 - 237

FERRER I. Cor pulmonale present-day status

Amer Heart J 1975 , 89 n° 5 657-664

EGGERS, GWN,

Jr., H.W. PALEY

J.J. LEONARD and J.W. WARREN (1962)

Hemodynamic responses to oxygen breathing in man

J. Appl. physiol 17: 75-79

- HECHT HH. et coll Impairment of LV function in a form
of cor pulmonale
Trans Assoc Am Physicians 75 263 276 1962
- HERBERT WH. et coll LV diastolic pressure elevation
consequent to pulmonary stenosis
circulation 40 887-892 1969
- KETY et coll The effects of altered arterial tensions
of carbon dioxide and oxygen on cerebral
blood flow and ~~cerebral~~ oxygen consumption
in normal young men
J. Clin invest. 27 484 1948
- LAFS M.M. et coll Volumes and compliances measured simultaneously
in the right and left ventricles of the
dog
Cir Res 20 565-569 1967
- LENFANT C. Arterial-alveolar difference in PCO_2
during air and oxygen breathing
J. Appl physiol 1966 21 1356-1362
- MOULOPOULOS S.D. Left ventricular performance during by
et coll pass or distension of the right ventricle
Cir Resp 17 484-491 1965
- OTIS A.B.; et coll Ballistocardiographic study of changes in
cardiac output due to respiration
J Clin Invest 25 413-421
- POOLE - WILSON PA. Effets de l'acidose respiratoire sur la
et coll contractilité myocardique et sur les
mouvements de K^+ au niveau du coeur
Bull Europ Physiopathologie respiratoire
1976 12 n° 2 - 225

- KARETZKY MS., KEIGHLEY JF., The effect of oxygen administration
and MITHOEFER JC. on gas exchange and cardiopulmonary
function in normal subjects
Resp Physiol 1971 12 361-370
North-Holland Publishing Company
Amsterdam
- SOBOL B.J. et coll Alteration of coronary blood flow
in the dog by inhalation of 100%
oxygen
Circulation Resp 11 797 1962
- SORBINI C.A. Discussion du travail de FOEX P. et
coll
Bull Europ physiol path resp 1976
12 232 - 239
- TAQUINI et coll Behavior of the RV following acute
constriction of the pulmonary artery
Cir Res 8 315-318 1960
- TAYLOR R.R. et coll Dependences of ventricular distensibility
on filling of the opposite ventricle
Am J Physiol 213 711-718 1967

- TARTULIER M., DEYRIEUX F. Le débit cardiaque au cours de
BLUM J., GALLET M. l'exercice musculaire
Nouv Presse Med 1972, 1, 727
- TARTULIER M. BOURRET M. Les pressions artérielles pulmonaires chez
DEYRIEUX F. l'homme normal
Effets de l'âge et de l'exercice
musculaire
Bull Physiol path resp 1972 8 1295-1321
- TARTULIER M. DEYRIEUX F. Les valeurs normales de la pression
artérielle systémique en fonction de
l'âge, de la consommation d'oxygène
et du débit cardiaque
J Med Lyon 1971 52 293-302
- TOURNIAIRE A. L'inhalation d'oxygène chez les
TARTULIER M. DEYRIEUX F. emphysémateux au stade du coeur pulmonaire
DODANE M. chronique. Son effet sur la pression
artérielle pulmonaire
Arch Mal Coeur 1958
- WITZLEB E. et coll Der Einfluss des arteriellen O₂-Drucks
auf die chemoreceptorischen Aktionspotentiale
in Carotissinusnerven. Pflüg
Arch ges Physiol 1955 261 211

TABLE DES MATIERES
=====

- Introduction..... page 1

- Symbolique..... page 8

- Matériel d'étude..... page 17

- 18 Observations..... page 29

- Méthodes d'Investigation..... page 66

- Résultats

 état basal..... page 77

 effort..... page 102

 oxygène..... page 122

- Tableaux Numériques et Diagrammes..... page 173

- Commentaires et Discussion

 état basal..... page 210

 effort..... page 215

 oxygène..... page 217

- Conclusions..... page 226

- Bibliographie..... page 228

E R R A T A

Page	Au lieu de	Lire
2	avec étude de la dilution	ou par dilution
4	O D I E	O P I E
9	VEMS/CT entre 65 et 80	VEMS/CV entre 65 % et 80 %
	VEMS/VR	VR/CT
11	$\dot{Q}$ 2,9 à 4	valeurs à ne pas retenir
	IC 3	2, 9 à 4
	$\dot{Q}_{aO_2}$ ml/mn 100 ± 30	ml/mn/m^2
	(...): $\dot{Q}$ L/mn x CaO_2 vol p cent	: $\dot{Q}$ L/mn/m ² x CaO_2 vol p cent 500 ± 90
12	$\bar{Q}\bar{v}O_2$ ml/mn 90 ± 20	$\dot{Q}\bar{v}O_2$ ml/mn/m ² 375 ± 80
	... sang au pouvoir oxyphorique	sang ou pouvoir oxyphorique
	POD 4	inférieure à 4
13	$\bar{P}\bar{V}Dtd$ inférieure 4	inférieure à 8
	RPT 400 ± 50	200 ± 50
15	FVGS x FC	ce paramètre a été abandonné secondairement dans la présente étude
27	valeur normale 0,88	supérieure à 0,88
30	diassète aggravation en nette	diabète aggravation nette
66	(V max)	(V MM)
67	(U) litis	(V) litres
71	a paramètres	paramètres

Page	au lieu de	lire
73	après calibrage en O_2 par humidifié	après calibration par O_2 100 p cent
83	$\bar{X} = P \overline{OD}$	$\bar{X} = \bar{P} OD$
89	$H^+ w M/l$	$H^+ n M/l$
130	$a \bar{v} O_2$ $a \bar{v} O_2 / CaO_2$	Delta $a \bar{v} O_2$ Delta $a \bar{v} O_2 / CaO_2$
133	Le problème sera étudié page	Le problème sera étudié page 143
147	(FC) fig	(FC) fig page 151
159	diagrammes	valeurs au-dessus ou à droites du 0=positives
161		valeurs au-dessous ou à gauche du 0=négatives
161	cycles - sec	cycles- s^{-1}
162	(caractéristiques du groupe P	caractéristiques du groupe p 19 et 20
164	PAo dynes/ 5 / sec cycles / sec	PAo mmHg dynes / s^{-1} / cm^{-5} cycles / s^{-1}
165	Au <u>total</u> l'épreuve d'effort	au Total l' <u>inhalation</u> d'oxygène 100 p cent
169	W syst VG = 56,4	Wsyst VG air = 56,4
178	DCO DCO/CT	ml/mn/mmHg ml/mn/mmHg/l
179	$\overset{\circ}{V}O_2$ Air nl/mn	$\overset{\circ}{V}O_2$ Air ml/mn
181	$\overset{\circ}{Q} O_2$ ml/mn $\overset{\circ}{Q}\bar{v}O_2$ ml/mn	$\overset{\circ}{Q}a O_2$ ml/mn/ m^2 $\overset{\circ}{Q}\bar{v}O_2$ ml/mn/ m^2
106	omission: $\overset{\circ}{Q} l/mn$ effort $\bar{X} : 11,43 \pm 2,75$ (SN = $9,75 \pm 2,56$ NS)	

BIBLIOGRAPHIE - OMISSIONS

- LACOSTE J. Composantes "circulatoires" et "ventilatoires" de
HANNHART B. la ductance du CO₂
Ann Med Nancy 1972 11 277-286
- PARENT J.G. Indices radiologiques d'hypertension pulmonaire
SCHRIJEN F. dans la maladie obstructive chronique
VIANA R.A. Bull Eur Physio Patho Resp 1976 12 637-650

